

Desloratadina, jarabe o solución oral 2.5 mg/ 5 ml, frasco 120 ml

Nivel de prescripción:

I.

Código institucional:

10561.

Principio Activo:

Desloratadina. (World Health Organization, 2022)

Forma farmacéutica:

Jarabe o solución oral.

Concentración:

2.5 mg/ 5 ml.

Código ATC:

R06AX27. (World Health Organization, 2022)

Dosis Diaria Definida:

5 mg. (World Health Organization, 2022)

Dosis:

Adultos y niños mayores de 12 años; se recomienda 2 cucharaditas (5 mg en 10 ml) una vez al día.

Niños de 6 a 11 años: se recomienda una dosis de 1 cucharadita (2.5 mg en 5 ml) una vez al día.

Niños de 12 meses a 5 años. Se recomienda una dosis de ½ cucharadita (1.25 mg en 2.5 ml) una vez al día.

Niños de 6 a 11 meses de edad: se recomienda una dosis de 2 ml (1 mg) una vez al día. (Merck Sharp & Dohme Corp, 2019)

Vía de administración:

Oral.

Indicaciones de uso:

Indicado en rinitis alérgica estacional, rinitis alérgica crónica, urticaria idiopática crónica. (Merck Sharp & Dohme Corp, 2019)

Reacciones adversas:

>10%

Dolor de cabeza (14%)

Fiebre (12%)

Irritabilidad (12%)

Diarrea (15%)

Infección de las vías respiratorias superiores (11 %)

Tos (11%)

1-10%

Mareos (4%)

Somnolencia (2%)

Mareos (4%)

Fatiga (2%)

Eritema (2%)

Erupción maculopapular (3%)

Dismenorrea (2%)

Infección del tracto urinario (4%)

Bronquitis (6%)

Epistaxis (3%)

Informes posteriores a la comercialización:

Taquicardia, palpitaciones.

Reacciones de hipersensibilidad, raras (p. ej., erupción cutánea, prurito, urticaria, edema, disnea y anafilaxia).

Hiperactividad psicomotora, trastornos del movimiento (incluyendo distonía, tics y síntomas extrapiramidales), convulsiones.

Enzimas hepáticas elevadas, incluida la bilirrubina, hepatitis (raro).

Trastornos del metabolismo y de la nutrición: aumento del apetito. (Medscape, a) (Merck Sharp & Dohme Corp, 2019)

Precauciones de uso:

Reacciones de hipersensibilidad que incluyen exantema, prurito, urticaria, se han informado edema, disnea y anafilaxia. (Merck Sharp & Dohme Corp, 2019)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad documentada a desloratadina o loratadina o componentes (Merck Sharp & Dohme Corp, 2019) (Medscape, b)

Interacciones:

Serías:

Erdafitinib, isocarboxazida, lasmiditan, metoclopramida intranasal, olopatadina intranasal, sotorasib, tepotinib, tranilcipromina.

Supervisar de cerca:

Amifampridina, berotralstat, bosutinib, cenobamato, crizotinib, daridorexant, diazepam intranasal, donepezilo transdérmico, eliglustat, esketamina intranasal, fostamatinib, gabapentina, gabapentina enacarbil, glecaprevir/pibrentasvir, istradefilina, ivacaftor, lomitapida, lonafarnib, lurasidona, midazolam intranasal, fenelzina, ponatinib, pregabalina, sareciclina, estiripentol, tucatinib, vemurafenib. ketoconazol, eritromicina o azitromicina, fluoxetina y cimetidina. (Medscape, c) (Merck Sharp & Dohme Corp, 2019)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Los datos limitados disponibles en mujeres embarazadas no son suficientes para informar un riesgo asociado con el fármaco de anomalías congénitas graves y abortos espontáneos.

No hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas.

Lactancia:

Tanto la desloratadina como la pseudoefedrina pasan a la leche materna; no hay datos suficientes sobre los efectos de la desloratadina en los lactantes ni sobre los efectos de la desloratadina en la producción de leche.

La decisión de interrumpir la lactancia o suspender el medicamento debe tomarse teniendo en cuenta los beneficios para el desarrollo y la salud de la lactancia materna, la necesidad clínica de la madre lactante y cualquier posible efecto adverso en el lactante amamantado debido a la terapia o a una afección materna subyacente. (Medscape, d) (Merck Sharp & Dohme Corp, 2019)

Referencias bibliográficas:

Merck Sharp & Dohme Corp. (15 de Marzo de 2019). U.S. Food and Drug Administration. Recuperado el Enero de 2023, de Desloratadina, 2.5 mg/ 5 ml:

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/021165s022,021300s019,021312s020,021563s008lbl.pdf

Medscape. (a). Medscape. Recuperado Enero de 2023, de Desloratadina: <https://reference.medscape.com/drug/clarinex-reditabs-desloratadine-343396#4>

Medscape. (b). Medscape. Recuperado Enero de 2023, de Desloratadina: <https://reference.medscape.com/drug/clarinex-reditabs-desloratadine-343396#5>

Medscape. (c). Medscape. Recuperado Enero de 2023, de Desloratadina:

<https://reference.medscape.com/drug/clarinex-reditabs-desloratadine-343396#3>

Medscape. (d). Medscape. Recuperado Enero de 2023, de Desloratadina:

<https://reference.medscape.com/drug/clarinex-reditabs-desloratadine-343396#6>

World Health Organization. (19 de Diciembre de 2022). WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Recuperado Enero de 2023, de Desloratadina: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=R06AX27