

Ergotamina en asociación/ (cafeína/ paracetamol), comprimido recubierto 1 mg/ (100 mg/ 300mg)

Nivel de prescripción:

I

Código institucional:

954

Principio activo:

Ergotamina/ cafeína/ paracetamol. (World Health Organization, 2023).

Forma farmacéutica:

Comprimido recubierto.

Concentración:

1 mg/ 100 mg/ 300 mg.

Código ATC:

N02CA52. (World Health Organization, 2023).

Dosis Diaria Definida:

4 mg (referente a ergotamina). (World Health Organization, 2023).

Dosis:

2 comprimidos tan pronto inicien los primeros síntomas de la crisis. Si no se obtiene respuesta, puede administrarse 1 comprimido cada hora.

No se debe sobrepasar los 6 comprimidos en un día, ni 10 comprimidos en una semana.

No recomendado en niños menores de 12 años. (Desma Laboratorio Farmacéutico SL, 2024)

Vía de administración:

Oral.

Indicaciones de uso:

Tratamiento agudo de las crisis de migraña, equivalentes migrañoides y cefaleas vasomotoras. (Desma Laboratorio Farmacéutico SL, 2024)

Reacciones adversas:

Frecuentes:

mareos, náuseas, vómitos, dolor abdominal.

Poco frecuentes:

Parestesias, hipoestesis, cianosis, vasoconstricción periférica, diarrea, Debilidad de una extremidad Dolor de extremidades. (Desma Laboratorio Farmacéutico SL, 2024)

Precauciones de uso:

Ergotamina puede provocar isquemia miocárdica o en casos raros, infarto, debido a sus propiedades vasoconstrictoras, incluso en pacientes sin historia previa conocida de enfermedades coronarias con dosis elevadas puede producirse vasoespasmo y con el uso continuado cambios fibróticos, en particular de la pleura y del retroperitoneo y más raramente de las válvulas cardíacas.

Si aparecen síntomas sugerentes de vasoespasmo (parestesia en dedos de manos y pies, cefaleas o síntomas de isquemia miocárdica, debe interrumpirse el tratamiento inmediatamente y consultar al médico.

El uso prolongado de cualquier tipo de analgésicos para el tratamiento de las cefaleas puede empeorar esta situación clínica

Contiene cafeína que puede producir un resultado positivo en las pruebas de control de dopaje. (Desma Laboratorio Farmacéutico SL, 2024)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a los principios activos de este medicamento o a alguno de los excipientes.

Trastornos circulatorios periféricos. Enfermedad vascular ocliterante. Cardiopatía isquémica. Hipertensión. Sepsis. Insuficiencia renal. Enfermedades hepáticas. Arteritis temporal.

Migraña hemipléjica o basilar

Tratamiento concomitante con otros medicamentos que se metabolizan por el CYP 3A4.

Tratamiento concomitante con agentes vasoconstrictores.

Tratamiento concomitante con antibióticos macrólidos, antiretrovirales inhibidores de la proteasa o de la transcriptasa inversa, antifúngicos azólicos. (Desma Laboratorio Farmacéutico SL, 2024)

Interacciones:

Medicamentos que se metabolizan por la misma vía del citocromo P-450 (CYP3A4). Sumatriptán, naratriptán, almotriptán, amprenavir, nelfinavir, ritonavir y saquinavir, efavirenz, eritromicina, claritromicina, azitromicina, sibutramina.

Precaución con nadolol, oxprenolol, propanolol, timolol, dopamina.

Paracetamol con flucloxacilina. (Desma Laboratorio Farmacéutico SL, 2024)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Contraindicado durante el embarazo debido a que la ergotamina tiene efectos oclitócicos y vasoconstrictores sobre la placenta y el cordón umbilical.

Lactancia:

Contraindicado durante la lactancia ya que se excreta por la leche materna y puede causar vómitos, diarrea, pulso débil y presión arterial lábil en el niño. (Desma Laboratorio Farmacéutico SL, 2024)

Referencias bibliográficas:

Desma Laboratorio Farmacéutico SL. (2024). Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Recuperado Marzo de 2023, de Ergotamina/Cafeína/Paracetamol:

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/39228/FT_39228.pdf

World Health Organization. (23 de Enero de 2023). WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Recuperado Marzo de 2023, de https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=N02CA52