Tioconazol, Crema 1%, tubo, 30 g

Nivel de prescripción:

II

Código institucional:

66

Principio activo:

Tioconazol. (World Health Organization, 2024)

Forma farmacéutica:

Crema.

Concentración:

1%.

Código ATC:

D01AC07. (World Health Organization, 2024)

Dosis Diaria Definida:

No aplica. (World Health Organization, 2024)

Dosis:

Debe aplicarse la cantidad suficiente en el área afectada y masajear suavemente la zona afectada y área circundante, una o dos veces por día, en la mañana y/o la noche. En áreas con intertrigo, la crema debe ser aplicada escasamente y bien dispersada para evitar la maceración.

Para las infecciones en las uñas la duración requerida del tratamiento es de hasta 6 meses, pero puede ser extendido hasta 12 meses. La duración del tratamiento requerido para lograr la cura, varía de paciente en paciente, dependiendo del organismo infectante y del sitio de infección. (Pfizer SRL, 2000)

Vía de administración:

Tópica.

Indicaciones de uso:

Para el tratamiento tópico de las infecciones dérmicas por hongos sensibles (dermatofitos y levaduras) y en aquellas condiciones complicadas por infección con bacterias Gram-positivas susceptibles. Infecciones tales como Tinea pedis, Tinea cruris, Tinea corporis y Tinea unguium. (Pfizer SRL, 2000)

Reacciones adversas:

Es bien tolerado luego de una aplicación local. No han sido observadas reacciones adversas sistémicas con la aplicación dérmica de esta droga. Se han informado síntomas de irritación local en algunos pacientes, usualmente en las primeras semanas de tratamiento y generalmente leve y transitoria. Sin embargo, si una reacción de hipersensibilidad se desarrolla con el uso del medicamento se debe discontinuar el tratamiento y se debe instituir una terapia apropiada. (Pfizer SRL, 2000)

Precauciones de uso:

Ninguna conocida. (Pfizer SRL, 2000)

Contraindicaciones:

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a los agentes antifúngicos imidazólicos o a cualquiera de los componentes de la medicación dérmica. (Pfizer SRL, 2000)

Interacciones:

hay interacciones conocidas con el fármaco. (Pfizer SRL, 2000)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Categoría de embarazo: C. El fármaco se utiliza con precaución solo si los beneficios superan los riesgos.

Los estudios en animales reportan riesgos y no se dispone de estudios en humanos o no se han realizado estudios en animales ni en humanos.

Lactancia:

Se desconoce si se distribuye a la leche. El fabricante recomienda a las mujeres interrumpir la lactancia mientras reciben el fármaco. (Pfizer SRL, 2000)

Referencias bibliográficas:

Comisión Terapéutica Central / Dirección Terapéutica Central. (Octubre de 2021).
igssgt.org. Recuperado Enero de 2024, de Listado de Medicamentos:
<https://www.igssgt.org/listado-de-medicamentos/>

Pfizer SRL. (Agosto de 2000). labeling.pfizer.com. Recuperado Marzo de 2024, de
tioconazol crema dermica al 1%:
<https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=9201>

World Health Organization. (26 de Enero de 2024). WHO Collaborating Centre for
Drug Statistics Methodology. Recuperado febrero de 2024, de Tioconazol:
https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=D01AC07