

Sulfadiacina argéntica, crema, tarro, 400 g

Nivel de prescripción:

III

Código institucional:

1384

Principio activo:

Sulfadiazina argéntica. (World Health Organization, 2024)

Forma farmacéutica:

Crema.

Concentración:

No aplica.

Código ATC:

D06BA01. (World Health Organization, 2024)

Dosis Diaria Definida:

No aplica. (World Health Organization, 2024)

Dosis:

La gravedad de la infección y el tipo de lesión a tratar determinarán la frecuencia de renovación del

vendaje, realizándose desde 1-2 veces al día en quemaduras y heridas no muy contaminadas, hasta cada 4-6 horas en el caso de heridas muy contaminadas.

La duración del tratamiento debe ser individualizada y basarse en la evaluación periódica de la herida. El uso debe revisarse después de 2 semanas y el plan de manejo debe ajustarse en consecuencia.

El tratamiento no debe ser suspendido mientras exista la posibilidad de infección. (Alliance Pharma (Ireland) Ltd., 2022)

Vía de administración:

Tópico.

Indicaciones de uso:

Indicado en adultos, adolescentes, niños, lactantes de 2 a 23 meses de edad para el del tratamiento y prevención de infecciones en quemaduras de segundo y tercer grado, así como en úlceras varicosas y de decúbito. (Alliance Pharma (Ireland) Ltd., 2022)

Reacciones adversas:

Dolor, quemazón, picor, erupción, necrosis de la piel, eritema multiforme, decoloración transitoria de la piel, anemia hemolítica, agranulocitosis, anemia aplásica, trombocitopenia, leucopenia, reacciones dermatológicas y de hipersensibilidad (p. ej., síndrome de Stevens-Johnson), hepatitis y necrosis hepatocelular, nefrosis tóxica, nefritis intersticial. (Medscape, a)

Precauciones de uso:

Tenga precaución en caso de deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa; puede ocurrir hemólisis.

Solo para uso tópico; evitar contacto visual.

El uso prolongado puede provocar una sobreinfección bacteriana o fúngica.

No se recomienda su uso en mujeres embarazadas a menos que el área quemada cubra más del 20% de la superficie corporal o los beneficios terapéuticos para el paciente superen los posibles riesgos para el feto.

Aunque la sulfadiazina de plata se absorbe mínimamente, reacciona con los fluidos corporales para liberar sulfadiazina, que se absorbe y puede alcanzar concentraciones séricas sustanciales.

La absorción de sulfadiazina de plata varía según el porcentaje de superficie corporal y la extensión del daño tisular; Es posible que se produzca cualquier reacción adversa asociada con las sulfonamidas, incluidas discrasias sanguíneas, reacciones dermatológicas y alérgicas (incluidas reacciones cutáneas potencialmente mortales (síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, dermatitis exfoliativa), reacciones gastrointestinales, hepatitis y necrosis hepatocelular, reacciones del sistema nervioso central y nefrosis tóxica.

Precaución en caso de insuficiencia hepática/ renal.

Solo para uso tópico; evitar el contacto con los ojos. (Medscape, b)

Contraindicaciones:

Alergia a las sulfas, hipersensibilidad, mujeres embarazadas a término o cerca de término; bebés prematuros o en bebés de 2 meses o menos. (Medscape, c)

Interacciones:

Serías:

Queratinocitos y fibroblastos cultivados alogénicos.

Supervisar de cerca:

Colagenasa, papaína, tripsina.

Menor:

Colagenasa, papaína, tripsina (Medscape, d)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Categoría de embarazo: C, X (cerca del término).

Lactancia:

Se desconoce si se distribuye en la leche materna; con precaución. (Medscape, e)

Referencias bibliográficas:

Alliance Pharma (Ireland) Ltd. (Marzo de 2022). Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Recuperado Febrero de 2024, de Sulfadiazina argéntica, 10 mg/g: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/53324/53324_ft.pdf

Comisión Terapéutica Central / Dirección Terapéutica Central. (Octubre de 2021). Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Recuperado Febrero de 2024, de Sulfadiazina argéntica, 10 mg/g: <https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2022/02/LISTADO-DE-MEDICAMENTOS-APROBADO-2021-JD.pdf>

Medscape. (a). Medscape. Recuperado Febrero de 2024, de Silver sulfadiazine: <https://reference.medscape.com/drug/silvadene-thermazene-silver-sulfadiazine-343477#4>

Medscape. (b). Medscape. Recuperado Febrero de 2024, de Silver sulfadiazine: <https://reference.medscape.com/drug/silvadene-thermazene-silver-sulfadiazine-343477#5>

Medscape. (c). Medscape. Recuperado Febrero de 2024, de Silver sulfadiazine: <https://reference.medscape.com/drug/silvadene-thermazene-silver-sulfadiazine-343477#5>

Medscape. (d). Medscape. Recuperado Febrero de 2024, de Silver sulfadiazine: <https://reference.medscape.com/drug/silvadene-thermazene-silver-sulfadiazine-343477#3>

Medscape. (e). Medscape. Recuperado Febrero de 2024, de Silver sulfadiazine: <https://reference.medscape.com/drug/silvadene-thermazene-silver-sulfadiazine-343477#6>

World Health Organization. (Enero de 2024). WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Recuperado Febrero de 2024, de Sulfadiazina argéntica: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=D06BA01