

# Betametasona valerato, loción 0.1%, frasco 50 ml

**Nivel de prescripción:**

I

**Código institucional:**

1385

**Principio activo:**

Betametasona. (World Health Organization, 2024)

**Forma farmacéutica:**

Loción.

**Concentración:**

0.1%.

**Código ATC:**

D07AC01. (World Health Organization, 2024)

**Dosis Diaria Definida:**

No aplica. (World Health Organization, 2024)

**Dosis:**

Adultos y niños mayores de 12 años: Aplicar una pequeña cantidad de la loción en el cuero cabelludo dos veces al día hasta observar mejoría o por un máximo de dos semanas. (Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A. , 2017)

**Vía de administración:**

Tópico.

**Indicaciones de uso:**

Tratamiento de las manifestaciones inflamatorias y pruriginosas de las dermatosis del cuero cabelludo que responden a los corticoesteroides, como dermatitis seborreica y psoriasis; en adultos y niños mayores de 12 años. (Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A. , 2017)

**Reacciones adversas:**

Frecuencia no definida:

Atrofia cutánea, estrías, acné, dermatitis perioral, foliculitis, picazón, cambios pigmentarios, irritación cutánea, hipertrichosis, supresión del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal en usos prolongados. (Medscape, a)

**Precauciones de uso:**

La terapia con corticoesteroides tópica de largo plazo puede interferir con el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, principalmente en niños y jóvenes.

Puede llegar a intervenir en el crecimiento y desarrollo de niños.

El uso prolongado de corticoesteroides puede aumentar la incidencia de infecciones secundarias, enmascararlas, prolongarlas o exacerbarlas.

Se debe evitar el uso prolongado en zonas extensas o con técnica oclusiva.

No debe entrar en contacto con ojos, heridas abiertas o mucosas.

El uso de corticoesteroides, así como su aplicación alrededor de los ojos o con técnica de vendaje oclusivo prolongado puede ocasionar glaucoma y cataratas.

El uso prolongado de corticoesteroides está asociado con el Sarcoma de Kaposi. (Medscape, b)

**Contraindicaciones:**

Hipersensibilidad al compuesto, micosis sistémicas o infecciones en el cuero cabelludo, presencia de infecciones bacterianas o víricas, enfermedades atróficas de la piel, utilizar sobre úlceras, ojos, heridas profundas o acné. En niños menores de 12 años. (Medscape, b)

### **Interacciones:**

Monitorear de cerca: Nirmatrelvir,ritonavir. (UpToDate, 2024)

### **Embarazo y lactancia:**

Embarazo:

La biodisponibilidad del medicamento tópico es variable y puede verse afectada con el tercer trimestre del embarazo. En general, el uso de esteroides tópicos no se asocia con riesgos de efectos adversos en el embarazo, sin embargo, puede aumentar el riesgo de recién nacidos con bajo peso si la madre utilizo tratamiento prolongado.

Se puede utilizar corticoesteroides tópicos para tratar dermatitis atópica en embarazadas si los medicamentos de primera línea son insuficientes. Debe evitarse utilizarse en áreas con alta absorción cutánea como la vulva y axilas.

Lactancia:

No se conoce la disponibilidad del fármaco en la leche materna al ser administrado de manera tópica, los esteroides sistémicos están presentes en la leche materna en cantidades que no se consideran peligrosas para el lactante, sin embargo, se deben administrar con precaución y evitar utilizar el fármaco alrededor del área del pezón y areola. (Medscape, d)

### **Referencias bibliográficas:**

Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A. (Septiembre de 2017). Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Obtenido de Betnovate 1 mg/g solución cutánea:[https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/45275/FT\\_45275.pdf](https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/45275/FT_45275.pdf)

Medscape. (a). Medscape. Recuperado Enero de 2023, de Betamethasone topical: <https://reference.medscape.com/drug/diprolene-luxiq-betamethasone-topical-343515#4>

Medscape. (b). Medscape. Recuperado Enero de 2023, de Betamethasone Topical: <https://reference.medscape.com/drug/diprolene-luxiq-betamethasone-topical-343515#5>

Medscape. (d). Medscape. Recuperado Enero de 2023, de Betamethasone topical:  
<https://reference.medscape.com/drug/diprolene-luxiq-betamethasone-topical-343515#6>

UpToDate. (2024). UpToDate. Recuperado Enero de 2023, de Betamethasone (topical):  
Drug information:  
[https://www.uptodate.com/contents/betamethasone-topical-drug-information?search=betamethasone%20topical&source=panel\\_search\\_result&selectedTitle=1~122&usage\\_type=panel&showDrugLabel=true&display\\_rank=1](https://www.uptodate.com/contents/betamethasone-topical-drug-information?search=betamethasone%20topical&source=panel_search_result&selectedTitle=1~122&usage_type=panel&showDrugLabel=true&display_rank=1)

World Health Organization. (26 de Enero de 2024). WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Recuperado Enero de 2024, de Betamethasone: [https://www.whocc.no/atc\\_ddd\\_index/?code=D07AC01](https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=D07AC01)