

Difenidol, tableta, 25 mg

Nivel de prescripción:

I

Código institucional:

950

Principio activo:

Clorhidrato de Difenidol. (World Health Organization, 2024)

Forma farmacéutica:

Tableta.

Concentración:

25 mg.

Código ATC:

A04AD M2. (World Health Organization, 2024)

Dosis Diaria Definida:

No aplica. (World Health Organization, 2024)

Dosis:

Adultos: 25 a 50 mg cada 6 horas, no exceder de 300 mg/día.

Niños mayores de 6 años o más de 22kg de peso corporal: 5 mg por kg de peso corporal en 24 horas. (Consejo de Salubridad Nacional, 2023)

Vía de administración:

Oral.

Indicaciones de uso:

Nausea y vómitos asociados a vértigo. Cinetosis. Prevención y control de nausea en enfermedad de Ménière, laberintitis y cirugía del oído medio. (Consejo de Salubridad Nacional, 2023) (Carranza, 2015)

Reacciones adversas:

Frecuentemente no definidas:

Somnolencia, visión borrosa, cefalea, intranquilidad, cansancio o debilidad, dificultad para dormir, dolor abdominal, resequedad de boca, erupción cutánea, alucinaciones visuales y auditivas, desorientación, confusión. (Consejo de Salubridad Nacional, 2023) (Carranza, 2015)

Precauciones de uso:

El fármaco puede ocasionar alucinaciones o confusión, es importante limitar su uso a pacientes hospitalizados o supervisión continua y por un máximo de 6 meses.

Su uso puede ocultar síntomas de intoxicación medicamentosa, obstrucción intestinal o tumor cerebral.

Se debe usar con precaución con pacientes que consumen depresores del sistema nervioso central y atropínicos.

Se debe utilizar con precaución con pacientes con insuficiencia renal.

Posee un leve efecto anticolinérgico periférico, se debe utilizar con precaución en pacientes con glaucoma, lesiones obstructivas del tracto gastrointestinal o genitourinario.

No se recomienda utilizar como tratamiento de náuseas o vómitos en el embarazo. (Carranza, 2015) (Consejo de Salubridad Nacional, 2023)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al compuesto. Enfermedad obstructiva gastrointestinal o genitourinaria, hipotensión, glaucoma, hipotensión arterial, insuficiencia renal. (Consejo de Salubridad Nacional, 2023)

Interacciones:

Serio, utilizar alternativas:

Depresores del sistema nervioso, antimuscarínicos. (Consejo de Salubridad Nacional, 2023)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Categoría C del embarazo. No está indicado para el manejo de náuseas y vómitos durante el tratamiento.

Lactancia:

No existe información sobre la presencia del fármaco en la leche materna, sus efectos en la producción de leche o el lactante. (Consejo de Salubridad Nacional, 2023)

Referencias bibliográficas:

Carranza, R. (2015). Difenidol: Antieméticos y antivertiginosos. En R. Carranza, *Vademécum Académico de Medicamentos*. McGraw Hill Education. Obtenido de

<https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1552§ionid=90369407>

Consejo de Salubridad Nacional. (28 de Abril de 2023). *Consejo de Salubridad Nacional*. Obtenido de Compendio Nacional de Insumos para la Salud:

<https://www.gob.mx/cms/uploads/csg/ProntuarioCNIS2023VF26052023V.pdf>

Vademecum. (Enero de 2020). *Difenidol Tabletas 25 mg*. Recuperado el 2024, de Laboratorio Serral, S.A. de C.V.:

<https://www.vademecum.es/mexico/medicamento/1276677/difenidol-tabletas-25-mg>

World Health Organization. (26 de Enero de 2024). *WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology*. Recuperado Enero de 2023, de Ondansetron:

https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=A04AD

World Health Organization. (26 de Enero de 2024). *WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology*. Recuperado Enero de 2023, de Ondansetron:

https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=A04AD