

Simeticona (Dimeticona), suspensión oral

40–100 mg/ ml, frasco gotero 15 – 40 ml

Nivel de prescripción:

II

Código institucional:

166

Principio activo:

Simeticona (Dimeticona). (World Health Organization, 2024)

Forma farmacéutica:

Suspensión oral.

Concentración:

40–100 mg/ml.

Código ATC:

A03AX13 M1 (World Health Organization, 2024) (Vademecum, 2016)

Dosis Diaria Definida:

0.5 g. (World Health Organization, 2024)

Dosis:

Niños menores de 2 años: 20 gotas o 1 ml tres veces al día después de cada una de las principales comidas. No administrar más de 200 mg de simeticona (100 gotas o 5 ml) al día.

Niños de 2 a 12 años: 40 mg (8 gotas o 0.4 ml) cada 8 horas.

Dosis máxima: 200 mg (40 gotas o 2 ml) cada 24 horas.

Adultos y adolescentes mayores de 12 años: 100 mg de simeticona (20 gotas o 1 ml) cada 8 horas después de cada una de las principales comidas, no administrar más de 500 mg de simeticona (100 gotas o 5 ml) al día. (Uriach Consumer Healthcare, S.L, 2016)

Vía de administración:

Oral.

Indicaciones de uso:

Alivio sintomático de los gases en adultos, niños y lactantes. (Church & Dwight CANADA CORP., 2020) (Laboratorios ARSAL S.A. DE C.V., 2020)

Reacciones adversas:

Heces blandas. (Medscape, a)

Precauciones de uso:

Si los síntomas persisten o si empeoran, o en caso de estreñimiento prolongado, el paciente debe consultar a su médico.

No está recomendada para el tratamiento de los cólicos del lactante debido a la limitada información disponible. (Church & Dwight CANADA CORP., 2020) (Laboratorios ARSAL S.A. DE C.V., 2020)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

Perforación y obstrucción intestinal conocida o sospechada. (Medscape, b) (Church & Dwight CANADA CORP., 2020) (Laboratorios ARSAL S.A. DE C.V., 2020)

Interacciones:

No se han realizado estudios de interacciones. (Church & Dwight CANADA CORP., 2020) (Laboratorios ARSAL S.A. DE C.V., 2020)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Usar con precaución, valorar riesgo-beneficio.

Lactancia:

No se absorbe sistémicamente; no se espera que se excrete en la leche.

(Medscape, c)

Referencias bibliográficas:

Church & Dwight CANADA CORP. (08 de Diciembre de 2020). *Dirección Nacional de Medicamentos*. Recuperado Febrero de 2024, de Simeticona (dimeticona), (Ovol gotas 40 mg/ ml): <https://expedientes.medicamentos.gob.sv/productos/buscarProducto>

Comisión Terapéutica Central / Dirección Terapéutica Central. (Octubre de 2021). *Instituto Guatemalteco de Seguridad Social*. Recuperado Febrero de 2024, de Simeticona (Dimeticona), suspensión oral: <https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2022/02/LISTADO-DE-MEDICAMENTOS-APROBADO-2021-JD.pdf>

Laboratorios ARSAL S.A. DE C.V. (3 de Diciembre de 2020). *Dirección Nacional de Medicamentos*. Recuperado Febrero de 2024, de Simeticona (Dimeticona) (Flatum suspensión gotas): <https://expedientes.medicamentos.gob.sv/productos/buscarProducto>

Medscape. (a). *Medscape*. Recuperado Febrero de 2024, de Simeticona (Dimeticona): <https://reference.medscape.com/drug/mylicon-phazyme-simethicone-342005#4>

Medscape. (b). *Medscape*. Recuperado Febrero de 2024, de Simeticona (Dimeticona): <https://reference.medscape.com/drug/mylicon-phazyme-simethicone-342005#5>

Medscape. (c). *Medscape*. Recuperado Febrero de 2024, de Simeticona (Dimeticona): <https://reference.medscape.com/drug/mylicon-phazyme-simethicone-342005#6>

World Health Organization. (26 de Enero de 2024). *WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology*. Recuperado Febrero de 2024, de Simeticona (Dimeticona): https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=A03AX13

Vademecum. (Enero de 2016). *Simeticona*. Obtenido de
<https://www.vademecum.es/principios-activos-simeticona-a03ax13+m1-us>