

Bisacodilo, tableta 5 mg

Nivel de prescripción:

I

Código institucional:

221

Principio activo:

Bisacodilo. (World Health Organization, 2023)

Forma farmacéutica:

Tableta.

Concentración:

5 mg.

Código ATC:

A06AB02 (World Health Organization, 2023)

Dosis Diaria Definida:

10 mg. (World Health Organization, 2023)

Dosis:

Adultos, adolescentes y niños mayores de 10 años:

5 – 10 mg al día antes de acostarse.

Niños de 2 a 10 años:

5 mg al día antes de acostarse. (Opella Healthcare Spain, S.L., 2019)

Vía de administración:

Oral.

Indicaciones de uso:

Alivio sintomático del estreñimiento ocasional para adultos, adolescentes y niños mayores de 10 años. (Opella Healthcare Spain, S.L., 2019)

Reacciones adversas:

Frecuencia no definida:

Calambre abdominal, desequilibrio de electrolitos y líquidos., diarrea excesiva, náuseas, ardor rectal, vértigo, vómitos. (Medscape, a)

Precauciones de uso:

No debe tomarse de forma continuada a diario o durante períodos prolongados sin investigar la causa del estreñimiento, el uso durante largos períodos de tiempo puede dar lugar a fenómenos de desequilibrio electrolítico, por lo que se recomienda que antes de iniciar un tratamiento con un laxante, los pacientes estén bien hidratados y que sus niveles de electrolitos sean normales.

Diagnosticar antes del tratamiento la causa del estreñimiento.

Descartar la presencia de apendicitis.

Monitorizar periódicamente los niveles de electrolitos en pacientes ancianos o debilitados.

En niños de 2 a 10 años, se debe administrar exclusivamente bajo control médico. (Opella Healthcare Spain, S.L., 2019)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al medicamento o alguno de los excipientes, Obstrucción o impactación severa Ileo parálítico, Síntomas de apendicitis o abdomen agudo quirúrgico, perforación intestinal, Vómitos, Sangrado rectal, trastorno del metabolismo hídrico y electrolítico, niños menores de 2 años. (Opella Healthcare Spain, S.L., 2019) (Medscape, b)

Interacciones:

Serías:

Sulfato de sodio/sulfato de magnesio/cloruro de potasio; sulfato de sodio/cloruro de potasio/sulfato de magnesio/polietilenglicol; sulfato de sodio/sulfato de potasio/sulfato de magnesio.

Supervisar de cerca: Deflazacort, diclorfenamida, citrato de potasio. (Medscape, c)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Las concentraciones plasmáticas del metabolito activo BHPM (metabolito activo de los laxantes bisacodilo y picosulfato de sodio) son bajas después de dosis de 10 mg/día durante 7 días; el uso a corto plazo generalmente se considera seguro durante el embarazo; evitar el uso a largo plazo.

Lactancia:

No detectado en la leche excretada tras la administración de 10 mg/día durante 7 días; utilizar con precaución. (Medscape, d)

Referencias bibliográficas:

Comisión Terapéutica Central/ Dirección Terapéutica Central. (Octubre de 2021).

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Recuperado Febrero de 2024, de Bisacodilo: <https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2022/02/LISTADO-DE-MEDICAMENTOS-APROBADO-2021-JD.pdf>

Medscape. (a). *Medscape*. Recuperado Noviembre de 2023, de Bisacodyl: <https://reference.medscape.com/drug/dulcolax-correctol-bisacodyl-342008#4>

Medscape. (b). *Medscape*. Recuperado Noviembre de 2023, de Bisacodyl: <https://reference.medscape.com/drug/dulcolax-correctol-bisacodyl-342008#5>

Medscape. (c). *Medscape*. Recuperado Noviembre de 2023, de Abacavir: <https://reference.medscape.com/drug/ziagen-abacavir-342600#3>

Medscape. (d). *Medscape*. Recuperado Noviembre de 2023, de Abacavir: <https://reference.medscape.com/drug/ziagen-abacavir-342600#6>

Opella Healthcare Spain, S.L. (Agosto de 2019). *Administración de Alimentos y Medicamentos*. Recuperado Noviembre de 2023, de CIMA: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/28410/FT_28410.html.pdf

World Health Organization. (23 de Enero de 2023). *WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology*. Recuperado Septiembre de 2023, de https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=A06AB02