

Ketanserina, gel 2%, tubo 75-100 g

Nivel de prescripción

II

Código institucional:

213

Principio activo:

Ketanserina. (World Health Organization, 2024)

Forma farmacéutica:

Gel.

Concentración:

20mg/g – 2%.

Código ATC:

C02KD01. (World Health Organization, 2024)

Dosis Diaria Definida:

No aplica. (World Health Organization, 2024)

Dosis:

Aplicar una capa delgada sobre el área a tratar dos veces al día.

Para fisuras anales aplicar una pequeña cantidad en el año 3 veces al día por 15 días.

Para úlceras cervicales: colocar un aplicador cada 24 horas por la noche durante dos semanas. (VADECUM, 2015)

Vía de administración:

Tópico.

Indicaciones de uso:

Tratamiento de úlceras dérmicas, úlceras de presión, preparación de la piel para injertos y colgajos, quemaduras no infectadas, y fisuras anales. Úlceras del cérvix uterino no neoplásicas. (VADECUM, 2015)

Reacciones adversas:

Dolor y ardor en el sitio de aplicación. (VADECUM, 2015)

Precauciones de uso:

Antes de iniciar tratamiento vaginal se deberá realizar Papanicolau para descartar lesiones neoplásicas. (VADECUM, 2015)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al compuesto. (VADECUM, 2015)

Interacciones:

No se conocen interacciones importantes. (VADECUM, 2015)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Se considera categoría C en el embarazo. No se conoce su disponibilidad luego de la aplicación o los posibles efectos sobre el embarazo y/o el feto.

Lactancia:

No se conoce su presencia en la leche materna luego de la aplicación, ni de sus efectos en la producción de leche o el lactante. (VADECUM, 2015)

Referencias bibliográficas:

VADECUM. (Enero de 2015). *VADECUM*. Obtenido de Ketanserina tópica:

<https://www.vademecum.es/mexico/medicamento/1277053/sufrexal-gel-topico>

World Health Organization. (26 de Enero de 2024). *WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology*. Recuperado Enero de 2023, de Otros cicatrizantes: https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=C02KD01