

Hidroxizina, jarabe 10 mg/ 5 ml, frasco, 60 ml

Nivel de prescripción:

II

Código institucional:

1348

Principio activo:

Hidroxizina. (World Health Organization, 2023)

Forma farmacéutica:

Jarabe.

Concentración:

10 mg/ 5 ml.

Código ATC:

N05BB01. (World Health Organization, 2023)

Dosis Diaria Definida:

75 mg. (World Health Organization, 2023)

Dosis:

Estados patológicos orgánicos en los que se manifiesta ansiedad:

Adultos: 50-100 mg cuatro veces al día.

Niños:

Menores de 6 años: 50 mg al día en dosis divididas.

Mayores de 6 años: 50-100 mg al día en dosis divididas.

Prurito debido a afecciones alérgicas como urticaria crónica y dermatosis atópicas y de contacto, y en prurito mediado por histamina:

Adultos: 25 mg 3 o 4 veces al día.

Menores de 6 años: 50 mg al día en dosis divididas.

Mayores de 6 años: 50-100 mg al día en dosis divididas.

Como premedicación y después de anestesia general:

Adultos: 50-100 mg.

Niños: 0.6 mg/kg. (Chartwell RX, LLC., 2024)

Vía de administración:

Oral.

Indicaciones de uso:

Alivio sintomático de la ansiedad y la tensión asociadas con la psiconeurosis y como complemento en estados patológicos orgánicos en los que se manifiesta ansiedad.

Tratamiento del prurito debido a condiciones alérgicas como urticaria crónica y dermatosis atópicas y de contacto, y en el prurito mediado por histamina.

Sedante cuando se usa como premedicación y después de anestesia general.
(Chartwell RX, LLC., 2024)

Reacciones adversas:

Frecuencia no definida:

Anticolinérgico: boca seca

Sistema nervioso central: Somnolencia (normalmente transitoria y puede desaparecer a los pocos días de continuar el tratamiento o al reducir la dosis), actividad motora involuntaria (temblor, convulsiones) normalmente con dosis considerablemente superiores a las recomendadas. No se ha informado depresión respiratoria clínicamente significativa a las dosis recomendadas. (Medscape, a)

Precauciones de uso:

Reevaluar periódicamente la utilidad del fármaco para cada paciente. Cuando se administran depresores del sistema nervioso central concomitantemente con hidroxizina, se debe reducir su dosis.

Desaconsejar el uso simultáneo de otros fármacos depresores del sistema nervioso central y se debe advertir que el efecto del alcohol puede aumentar. Se han notificado casos de prolongación del QT y Torsade de Pointes durante el uso poscomercialización de hidroxizina. En raras ocasiones, la hidroxizina puede causar pustulosis exantemática generalizada. Los sedantes pueden causar confusión y sedación excesiva en los ancianos; pacientes de edad avanzada en general.

El tratamiento debe iniciarse con dosis bajas y observarse estrechamente. (Chartwell RX, LLC., 2024)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad documentada o producto relacionado que incluye cetirizina y levocetirizina y componentes de la formulación.

Intervalo QT prolongado.

Administración subcutánea, intraarterial o intravenosa. (Chartwell RX, LLC., 2024) (Medscape, b)

Interacciones:

Serías:

Amiodarona, amisulprida, anagrelida, trióxido de arsénico, arteméter, arteméter/lumefantrina, asenapina, asenapina transdérmica, bedaquilina, benzohidrocodona/acetaminofén, buprenorfina bucal, implante subdérmico de buprenorfina, buprenorfina transdérmica, buprenorfina, inyección de acción prolongada, oxibatos de calcio/magnesio/potasio/sodio, ceritinib, cloroquina, citalopram, clozapina, crizotinib, desflurano, disopiramida ,dofetilida ,droperidol eluxadolina, encorafenib, entrectinib, eribulina, fexinidazol, flecainida, fluoxetina, foscarnet, vidriodegib, sulfato de hidroxicloroquina, ibutilida, iloperidona, isocarboxazida, isoflurano, lefamulina, lenvatinib, lofexidina, lopinavir, macimorelina, metoclopramida intranasal, midostaurina, mifepristona, mobocertinib, nilotinib, olopatadina intranasal, osimertinib, oxaliplatino, ozanimod, paliperidona, panobinostato, pazopanib, pimavanserina, pimozida, pitolisante, ponesimod,

procainamida, propafenona, quetiapina, quinidina, quinina, ribociclib, saquinavir, selpercatinib, sevoflurano, siponimod, oxibato de sodio, sorafenib, sotalol, tetrabenazina, toremifeno, tranilcipromina, trazodona, vandetanib, vemurafenib, ziprasidona.

Supervisar de cerca:

Acrivastina, albuterol, alfentanilo, alfuzosina, alprazolam, amifampridina, amisulprida, amitriptilina, amobarbital, amoxapina, apomorfina, arformoterol, aripiprazol, armodafinilo, asenapina, asenapina transdérmica, atomoxetina, avapritinib, azelastina, azitromicina, baclofeno, belladona y opio, benperidol, benzoftamina, brexanolona, brexpiprazol, brimonidina, brivaracetam, bromfeniramina, buprenorfina, buprenorfina bucal, implante subdérmico de buprenorfina, buprenorfina transdérmica, buprenorfina, inyección de acción prolongada, butabarbital, butalbital, butorfanol, cafeína, carbinoxamina, carisoprodol, hidrato de cloral, clordiazepóxido, clorfeniramina, clorpromazina, clorzoxazona, cinarizina, ciprofloxacina, claritromicina, clemastina, clobazam, clomipramina, clonazepam, clonidina, clorzepar, clozapina, codeína, ciclizina, ciclobenzaprina, ciproheptadina, dantroleno, daridorexante, dasatinib, degarélix, desflurano, desipramina, deutetrabenazina, dexclorfeniramina, dexfenfluramina, dexmedetomidina, dexmetilfenidato, dextroanfetamina, dextromoramida, diamorfina, diazepam, diazepam intranasal, dietilpropión, difelikefalina, clorhidrato de difenoxina, dimenhidrinato, difenhidramina, clorhidrato de difenoxilato, dipipanona, dobutamina, dolasetrón, donepezilo, donepezilo transdérmico, dopamina, dopexamina, dosulepina, doxepina, doxilamina, droperidol, efavirenz, eliglustat, efedrina, epinefrina, epinefrina racémica, base de eritromicina, etilsuccinato de eritromicina, lactobionato de eritromicina, estearato de eritromicina, escitalopram, esketamina intranasal, estazolam, etanol, etomidato, ezogabina, fenfluramina, fentanilo, fentanilo intranasal, fentanilo transdérmico, fentanilo transmucoso, fingolimod, flibanserina, fluconazol, flufenazina, flurazepam, fluvoxamina, formoterol, fostemsavir, gabapentina, gabapentina enacarbil, ganaxolona, gemifloxacina, gemtuzumab, gilteritinib, tosilato de glicopirronio tópico,

goserelina, centella asiática, granisetron, haloperidol, espino, histrelina, lúpulo, hialuronidasa, hidromorфона, hiosciamina, aerosol de hiosciamina, iloperidona, Imipramina, inotuzumab, isoproterenol, itraconazol, ivosidenib, kavá, ketamina, ketotifeno, oftálmico, lapatinib, lasmiditán, lemborexante, leuprolida, levalbuterol, levofloxacin, levorfanol, lisdexanfetamina, litio, lofepramina, lofexidina, loperamida, loprazolam, Lorazepam, lormetazepam, loxapina, loxapina inhalada, lurasidona, maprotilina, marijuana, mefloquina, melatonina, meperidina, meprobamato, metaproterenol, metaxalona, metadona, metanfetamina, metocarbamol, metilendioximetanfetamina, midazolam, midazolam intranasal, midodrina, mirtazapina, modafinilo, morfina, agripalma, moxifloxacin, moxonidina, nabilona, nalbufina, noradrenalina, nortriptilina, octreotida, ofloxacin, olanzapina, ondansetrón, tintura de opio, orfenadrina, osilodrostat, oxazepam, oxicodona, oximorфона, paliperidona, papaveretum, papaverina, paroxetina, pasireotida, flor de la pasión, pentamidina, pentazocina, pentobarbital, perampanel, perfenazina, fendimetrazina, fenelzina, fenobarbital, fentermina, fenilefrina, fenilefrina via oral, folcodina, pimozida, pirbuterol, posaconazol, pregabalina, primaquina, primidona, prochlorperazina, prometazina, Propofol, propilhexedrina, protriptilina, quazepam, quetiapina, ramelteon, ranolazina, rilpivirina, risperidona, romidepsina, salmeterol, escutelaria, secobarbital, sertralina, sevoflurano, bolsa de pastor, solifenacina, estiripentol, sufentanilo, sunitinib, tacrolimús, tapentadol, telavancina, temazepam, terbutalina, tioridazina, tiotixeno, topiramato, tramadol, trazodona, triazolam, triclabendazol, triclofos, trifluoperazina, trimipramina, triprolidina, triptorelina, valbenazina, valeriana, vardenafilo, venlafaxina, voclosporina, vorinostato, xilometazolina, yohimbina, ziconotida, ziprasidona, zotepina. (Medscape, c)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Se considera contraindicado en las primeras etapas del embarazo (primer trimestre) hasta que se disponga de más datos sobre el embarazo en humanos; experiencia limitada en el embarazo humano, ya sea para el medicamento en sí o para medicamentos de la misma clase o con mecanismos de acción similares, incluido el primer trimestre, los datos limitados actuales sugieren que el medicamento no representa un riesgo significativo de toxicidad para el desarrollo, incluida la restricción del crecimiento, anomalías estructurales, funcional. /déficits de comportamiento o muerte en cualquier momento del embarazo.

Lactancia:

Se desconoce la excreción en la leche; utilizar con precaución. (Medscape, d)

Referencias bibliográficas:

Comisión Terapéutica Central/ Dirección Terapéutica Central. (Mayo de 2024).

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Recuperado Septiembre de 2023, de <https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2024/07/Actualizacion-al-Listado-Basico-de-Medicamentos-Mayo-2024-IGSS-rev-01.pdf>

Chartwell RX, LLC. (Septiembre de 2024). Food and Drug Administration.

Recuperado Septiembre de 2024, de Hydroxyzine:
<https://www.drugs.com/pro/hydroxyzine-syrup.html>

Medscape. (a). *Medscape*. Recuperado Septiembre de 2023, de Hydroxyzine:

<https://reference.medscape.com/drug/atarax-vistaril-hydroxyzine-343395#4>

Medscape. (b). *Medscape*. Recuperado Septiembre de 2023, de Hydroxyzine:

<https://reference.medscape.com/drug/atarax-vistaril-hydroxyzine-343395#5>

Medscape. (c). *Medscape*. Recuperado Septiembre de 2023, de Hydroxyzine:

<https://reference.medscape.com/drug/atarax-vistaril-hydroxyzine-343395#3>

Medscape. (d). *Medscape*. Recuperado Septiembre de 2023, de Hydroxyzine:

<https://reference.medscape.com/drug/atarax-vistaril-hydroxyzine-343395#6>

World Health Organization. (23 de Enero de 2023). *WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology*. Recuperado Septiembre de 2023, de Hidroxizina: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=N05BB01