

Haloperidol, tableta de 5 mg

Nivel de prescripción:

II

Código institucional:

815

Principio activo:

Haloperidol. (World Health Organization, 2023)

Forma farmacéutica:

Tableta.

Concentración:

5 mg.

Código ATC:

N05AD01. (World Health Organization, 2023)

Dosis Diaria Definida:

8 mg. (World Health Organization, 2023)

Dosis:

Adultos:

Dosis inicial: 0.5 a 5 mg, vía oral, cada 8 a 12 h, luego ajustar dosis según necesidad.

Dosis máxima: 100 mg/día. Dosis de mantenimiento: 3 a 10 mg/ día.

Niños menores de 3 años:

Dosis no establecida.

Dosis inicial: 0.025 a 0.05 mg/ kg/ día, vía oral, dividida en 2 o 3 tomas, dosis que pueden incrementarse según necesidad. Dosis máxima: 10 mg/ día (0.15 mg/ kg).

Náusea y vómito:

Síndrome de Tourette's y tics severos: 0.5 a 1.5 mg, vía oral, 3 veces al día.

Hipo intratable: 1.5 mg, vía oral, 3 veces al día; alternatively se puede administrar 3 a 15 mg/ día, intramuscular o intravenoso (en dosis divididas).

Tratamiento adyuvante a corto plazo de la ansiedad severa: 0.5 mg, vía oral, 2 veces al día. Los niños y los pacientes geriátricos, o debilitados, son más propensos al desarrollo del extrapiramidismo y de hipotensión ortostática y requieren en general de dosis más bajas. (EMPRESA LABORATORIOS MEDSOL, 2022)

Vía de administración:

Oral.

Indicaciones de uso:

Tratamiento de síntomas en esquizofrenia y prevención de recaídas, otras psicosis (especialmente la paranoide).

Manía e hipomanía.

Agresión, hiperactividad y automutilación en pacientes con retraso mental o daño orgánico cerebral.

Tratamiento adjunto a corto plazo de la agitación psicomotora moderada a severa asociada con comportamiento impulsivo o peligroso.

Náuseas y vómitos. (EMPRESA LABORATORIOS MEDSOL, 2022)

Reacciones adversas:

Frecuencia no definida

Síntomas extrapiramidales, acatisia, distonía, rigidez muscular, síndrome neuroléptico maligno (poco frecuente pero grave), parkinsonismo, discinesia tardía.

Común:

Efectos anticolinérgicos, sedación, aumento de peso, disfunción eréctil, oligomenorrea o amenorrea.

Menos común:

Hipotensión ortostática (después de inyección intramuscular), taquicardia, agitación, ansiedad, edema cerebral, depresión, mareos, euforia, dolor de cabeza, insomnio, poiquilothermia, inquietud, debilidad, confusión. Anorexia, estreñimiento, dispepsia, íleo, disminución del reflejo nauseoso, opacidades del cristalino (uso prolongado).

Poco común:

Cambios de electrocardiograma, fotosensibilidad, prurito, diarrea, discrasia sanguínea, trastorno eyaculatorio, galactorrea.

Extraño:

Convulsión, ictericia colestásica, priapismo. (Medscape, a)

Precauciones de uso:

Este medicamento puede interferir con actividades que requieran atención continua como manejar u operar maquinarias. (EMPRESA LABORATORIOS MEDSOL, 2022)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad documentada.

Depresión tóxica grave del sistema nervioso central o estados comatosos por cualquier causa.

Enfermedad de Parkinson.

Demencia con cuerpos de Lewy. (EMPRESA LABORATORIOS MEDSOL, 2022)
(Medscape, b)

Interacciones:

Serías:

Adagrasib, amiodarona, amisulprida, amitriptilina, amoxapina, anagrelida, apalutamida, apomorfina, trióxido de arsénico, arteméter/lumefantrina, avapritinib, axitinib, benzohidrocodona/acetaminofén, bosutinib, bromocriptina, buprenorfina, buprenorfina bucal, implante subdérmico de buprenorfina, buprenorfina

transdérmica, buprenorfina, inyección de acción prolongada, cabergolina, oxibatos de calcio/magnesio/potasio/sodio, carbamazepina, ceritinib, cloranfenicol, clorpromazina, citalopram, claritromicina, clomipramina, cobimetinib, crizotinib, dacomitinib, desflurano, desipramina, dofetilida, dopamina, doxepina, dronedarona, droperidol, elastrante, eliglustat, encorafenib, entrectinib, epinefrina, epinefrina racémica, eribulina, base de eritromicina, etilsuccinato de eritromicina, lactobionato de eritromicina, estearato de eritromicina, fentanilo, fentanilo intranasal, fentanilo transdérmico, fentanilo transmucoso, fexinidazol, fingolimod, fluconazol, fluoxetina, flufenazina, formoterol, fosfenitoína, givosirán, vidriodegib, hidrocodona, sulfato de hidroxyclorequina, idealisib, imipramina, indinavir, infigratinib, inotuzumab, isoflurano, ivabradina, ivosidenib, ketoconazol, lemborexante, levodopa, levoketoconazol, lisurida, lofepramina, lopinavir, lumefantrina, lurbinectedina, macimorelina, maprotilina, metildopa, metoclopramida intranasal, midazolam intranasal, mifepristona, mobocertinib, moxifloxacin, naloxegol, neratinib, nilotinib, nortriptilina, octreotida, octreotida (antídoto), olaparib, olopatadina intranasal, omaveloxolona, ondansetrón, oxaliplatino, pacritinib, panobinostat, paroxetina, pemigatinib, perfenazina, pexidartinib, fenitoína, pitolisant, posaconazol, pramipexol, proclorperazina, promazina, prometazina, protriptilina, quinidina, quinupristina/dalfopristina, ribociclib, romidepsina, ropeginterferón alfa 2b, ropinirol, safinamida, saquinavir, selinexor, selumetinib, sevoflurano, siponimod, oxibato de sodio, sufentanilo sublingual, tazemetostat, tetrabenazina, tioridazina, toremifeno, trazodona, trifluoperazina, trimipramina, tucatinib, bromuro de umeclidinio/vilanterol inhalado, vandetanib, vemurafenib, venetoclax, vilanterol/furoato de fluticasona inhalado, voxelotor, ziprasidona.

Supervisar de cerca:

Abiraterona, abobotulinumtoxinaA, acalabrutinib, acilidinio, acrivastina, albuterol, alfentanilo, alfuzosina, almotriptán, alprazolam, amifampridina, amitriptilina, amobarbital, amoxapina, combinaciones de anticolinérgicos y sedantes, apomorfina, arformoterol, aripiprazol, armodafinilo, arteméter, asenapina, asenapina transdérmica, atazanavir, atogepante, atomoxetina, atracurio, atropina,

atropina intravenosa/intramuscular, avanaflo, avapritinib, azelastina, azitromicina, baclofeno, bedaquilina, alcaloides de belladona, belladona y opio, belzutifán, benperidol, benzohidrocodona/acetaminofén, benzofetamina, benzotropina, bosentán, bosutinib, brexanolona, brexpiprazol, brimonidina, brivaracetam, bromfeniramina, buprenorfina, buprenorfina bucal, implante subdérmico de buprenorfina, buprenorfina transdérmica, buprenorfina, inyección de acción prolongada, bupropión, butabarbital, butalbital, butorfanol, cabozantinib, cafeína, cannabidiol, capecitabina, carbamazepina, carbinoxamina, carisoprodol, carvedilol, celecoxib, cenobamato, hidrato de cloral, clordiazepóxido, cloroquina, clorfeniramina, clorpromazina, clorzoxazona, cimetidina, cinarizina, ciprofloxacina, cisatracurio, clemastina, clobazam, clomipramina, clonazepam, clonidina, clorazepar, clozapina, cobicistat, codeína, conivaptán, crizotinib, crofelemer, ciclizina, ciclobenzaprina, ciproheptadina, dabrafenib, dantroleno, daridorexante, darifenacina, darunavir, dasatinib, deferasiroxi, deflazacort, degarélix, desflurano, desipramina, desvenlafaxina, deutetrabenazina, dexclorfeniramina, dexfenfluramina, dexmedetomidina, dexmetilfenidato, dextroanfetamina, dextrometorfano, dextromoramida, diamorfina, diazepam, diazepam intranasal, diciclomina, dietilpropión, difelikefalina, clorhidrato de difenoxina, dihidroergotamina, dimenhidrinato, difenhidramina, clorhidrato de difenoxilato, dipipanona, dobutamina, dolasetrón, donepezilo, donepezilo transdérmico, dopamina, dopexamina, dosulepina, doxepina, doxilamina, dronedarona, droperidol, duvelisib, efavirenz, elagolix, eletriptán, eliglustat, elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir disoproxilfumarato, encorafenib, enzalutamida, efedrina, epinefrina, epinefrina racémica, mesilatos ergoloides, ergotamina, escitalopram, esketamina intranasal, estazolam, etanol, etomidato, etravirina, ezogabina, fedratinib, fenfluramina, fentanilo, fesoterodina, finarenona, flavoxato, flecainida, flibanserina, fluoxetina, flufenazina, flurazepam, fluvoxamina, formoterol, foscarnet, fostemsavir, frovatriptán, gadobenato, ganaxolona, gemifloxacina, gemtuzumab, gilteritinib, fenilbutirato de glicerol, glicopirrolato, glicopirrolato inhalado, tosilato de glicopirronio tópico, goserelina, granisetron,

guanfacina, beleño, histrelina, homatropina, hidrocodona, hidromorfona, hidroxizina, hiosciamina, aerosol de hiosciamina, ibrutinib, ifosfamida, iloperidona, imatinib, imipramina, incobotulinumtoxinaA, indacaterol, inhalado, ipratropio, sulfato de isavuconazonio, isoniazida, isoproterenol, isradipino, istradefilina, itraconazol, ivacaftor, ivosidenib, ketamina, ketoconazol, ketotifeno, oftálmico, lapatinib, lasmiditán, lemborexante, lenacapavir, lenvatinib, letermovir, leuprolida, levalbuterol, levamlodipino, levofloxacina, levoketoconazol, levomilnaciprán, levorfanol, linezolid, lisdexanfetamina, litio, lofepramina, lofexidina, loprazolam, Lorazepam, lorcaserina, lorlatinib, lormetazepam, loxapina, loxapina inhalada, lumateperona, lurasidona, maprotilina, maraviroc, marihuana, mavacamten, meclizina, mefloquina, melatonina, meperidina, meprobamato, metaproterenol, metaxalona, metadona, metanfetamina, metocarbamol, metescopolamina, metilendioximetanfetamina, metilergonovina, metilfenidato, metoclopramida, metoprolol, mexiletina, midazolam, midazolam intranasal, midodrina, mifepristona, milnaciprán, mirabegrón, mirtazapina, mitotano, modafinilo, morfina, agripalma, moxonidina, nabilona, nafcilina, nalbufina, naldemedina, naratriptán, nebivolol, nefazodona, nelfinavir, nilotinib, noradrenalina, norgestrel, nortriptilina, ofloxacina, olanzapina, oliceridina, olodaterol inhalado, onabotulinumtoxinaA, tintura de opio, orfenadrina, osilodrostato, osimertinib, oxaliplatino, oxazepam, oxibutinina, oxibutinina tópica, oxibutinina transdérmica, oxicodona, oximorfona, ozanimod, palbociclib, paliperidona, palovaroteno, pancuronio, papaveretum, papaverina, parecoxib, paroxetina, pasireotida, pazopanib, peginterferón alfa 2b, pentazocina, pentobarbital, perfenazina, fendimetrazina, fenelzina, fenobarbital, fentermina, fenilefrina, fenilefrina vía oral, folcodina, pimizida, pirbuterol, posaconazol, pralidoxima, primaquina, primidona, procarbazona, proclorperazina, prometazina, propafenona, propantelina, propofol, propranolol, propilhexedrina, protriptilina, quazepam, quetiapina, quinacrina, quinina, quizartinib, ramelteon, ranolazina, rapacuronio, remimazolam, ribociclib, rifabutina, rifampicina, rifapentina, rilpivirina, rimabotulinumtoxinaB, rimegepant, risperidona, ritonavir, rizatriptán, rocuronio, rolapitante, rucaparib, ruxolitinib, ruxolitinib tópico, salmeterol, escopolamina,

escutelaria, secobarbital, selegilina, selpercatinib, sertralina, sevoflurano, bolsa de pastor, sulfato de sodio/sulfato de magnesio/cloruro de potasio, sulfato de sodio/sulfato de potasio/sulfato de magnesio, solifenacina, sonidegib, sorafenib, escaso, estiripentol, sufentanilo, sufentanilo sublingual, sulfametoxazol, sumatriptán, sumatriptán intranasal, sunitinib, suvorexante, tacrolímús, tadalafilo, tamoxifeno, tamsulosina, tapentadol, tazemetostato, tecovirimat, teduglutida, telavancina, temazepam, terbinafina, terbutalina, tetrabenazina, tezacaftor, tioridazina, tiotixeno, timolol, tinidazol, tiotropio, tipranavir, tofacitinib, tolterodina, topiramato, trabectedina, tramadol, tranilcipromina, trazodona, triazolam, triclabendazol, triclofos, trifluoperazina, trihexifenidilo, trimetoprima, trimipramina, triprolidina, triptorelina, tropisetron, cloruro de trospio, valbenazina, vardenafilo, vecuronio, venlafaxina, vilazodona, voclosporina, voriconazol, vorinostato, xilometazolina, yohimbina, zanubrutinib, ziconotida, ziprasidona, zolmitriptán, zotepina. (Medscape, c)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

No existen estudios bien controlados en mujeres embarazadas; hay informes de casos de malformaciones de las extremidades observadas después del uso materno de medicamentos junto con otros medicamentos que se sospecha tienen potencial teratogénico durante el primer trimestre del embarazo; en estos casos no se establecieron relaciones causales; sin embargo, dicha experiencia no excluye la posibilidad de daño fetal debido a la terapia; el medicamento debe usarse durante el embarazo o en mujeres con probabilidades de quedar embarazadas sólo si el beneficio justifica claramente un riesgo potencial para el feto; Los bebés no deben ser amamantados durante el tratamiento farmacológico.

Los recién nacidos expuestos a fármacos antipsicóticos durante el tercer trimestre del embarazo corren riesgo de sufrir síntomas extrapiramidales y/o de abstinencia después del parto; ha habido informes de agitación, hipertonía, hipotonía, temblor, somnolencia, dificultad respiratoria y trastornos alimentarios en estos recién nacidos; estas complicaciones han variado en gravedad; Si bien en algunos casos los síntomas han sido autolimitados, en otros casos los recién nacidos han requerido apoyo en la unidad de cuidados intensivos y hospitalización prolongada.

Lactancia:

El fármaco se excreta con la leche materna humana; Los bebés no deben ser amamantados durante el tratamiento farmacológico. (Medscape, d)

Referencias bibliográficas:

Comisión Terapéutica Central/ Dirección Terapéutica Central. (Octubre de 2021).

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Recuperado Septiembre de 2023, de <https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2022/02/LISTADO-DE-MEDICAMENTOS-APROBADO-2021-JD.pdf>

EMPRESA LABORATORIOS MEDSOL CECMED. (Junio de 2022). Recuperado

Septiembre de 2023, de Haloperidol:
<https://www.cecmed.cu/file/11213/download?token=VT8zGUkX>

Medscape. (a). Medscape. Recuperado Septiembre de 2023, de Haloperidol:

<https://reference.medscape.com/drug/haldol-decanoate-haloperidol-342974#4>

Medscape. (b). Medscape. Recuperado Septiembre de 2023, de Haloperidol:

<https://reference.medscape.com/drug/haldol-decanoate-haloperidol-342974#5>

Medscape. (c). Medscape. Recuperado Septiembre de 2023, de Haloperidol:

<https://reference.medscape.com/drug/haldol-decanoate-haloperidol-342974#3>

Medscape. (Marzo de 2023 d). Medscape. Recuperado Septiembre de 2023, de Haloperidol: <https://reference.medscape.com/drug/haldol-decanoate-haloperidol-342974#6>

World Health Organization. (23 de Enero de 2023). WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Recuperado Septiembre de 2023, de https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=N05AD01