

Ketoconazol, óvulos vaginales, 400 mg

Nivel de prescripción:

I

Código institucional:

68

Principio activo:

Ketoconazol. (World Health Organization, 2024)

Forma farmacéutica:

Óvulos vaginales.

Concentración:

400 mg.

Código ATC:

G01AF11. (World Health Organization, 2024)

Dosis Diaria Definida:

0.4 g. (World Health Organization, 2024)

Dosis:

Candidiasis vulvovaginal no complicada (≤ 3 episodios en el año anterior): Un óvulo diario intravaginal durante 3 ó 5 días consecutivos según la intensidad de los síntomas, administrar por las noches.

Candidiasis vulvovaginal complicada Un óvulo diario intravaginal durante 7-14 días consecutivos según la intensidad de los síntomas, administrar por las noches.

Candidiasis vulvovaginal recurrente (≥ 4 episodios confirmados microbiológicamente en el último año): Administrar un ovulo por la noche por 10-14 días de tratamiento seguido de la administración de un azol vía oral. (Isdin SA, 2016)

Vía de administración:

Tópico vaginal.

Indicaciones de uso:

Tratamiento local de: Candidiasis vulvovaginal no complicada y complicada. Candidiasis vulvovaginal recurrente. (Isdin SA, 2016)

Reacciones adversas:

Frecuentes:

Sensación de escozor vulvovaginal, irritación de la zona de aplicación. (Isdin SA, 2016)

Precauciones de uso:

Si aparece sensibilidad local o reacción alérgica, el tratamiento se deberá suspender y aplicar las medidas terapéuticas adecuadas.

Aplicar medidas generales de higiene con el fin de controlar posibles fuentes de infección y reinfección. Sólo para uso vaginal. (Isdin SA, 2016)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. (Isdin SA, 2016)

Interacciones:

Se debe evitar el contacto entre productos de látex tales como diafragmas anticonceptivos o preservativos y ciertos productos vaginales, entre los que se encuentra ketoconazol óvulos, ya que el caucho puede dañarse. (Isdin SA, 2016)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

No se han realizado estudios clínicos adecuados y bien controlados durante el embarazo y la lactancia.

Lactancia:

Ketoconazol se excreta en la leche materna después de su administración oral. No hay datos comparables en mujeres lactantes que hayan recibido ketoconazol en forma de óvulos vía vaginal.

Por lo tanto, ketoconazol óvulos debe usarse en embarazo y lactancia sólo cuando, según criterio médico, el beneficio para el paciente supere los posibles riesgos para el feto/niño lactante. (Isdin SA, 2016)

Referencias bibliográficas:

Comisión Terapéutica Central/ Dirección Terapéutica Central. (Octubre de 2021).

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Recuperado Septiembre de 2023, de ketoconazol: <https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2022/02/LISTADO-DE-MEDICAMENTOS-APROBADO-2021-JD.pdf>

Isdin SA. (Julio de 2016). Recuperado Septiembre de 2023, de Ketoconazol: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/57685/FT_57685.pdf

World Health Organization. (23 de Enero de 2023). WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Recuperado Septiembre de 2023, de Ketoconazol: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=G01AF11