

Finerenona comprimido recubierto, 20 mg

Nivel de prescripción:

II.

Código institucional:

1001828.

Principio activo:

Finerenona. (World Health Organization, 2026)

Forma farmacéutica:

Comprimido recubierto.

Concentración:

20 mg.

Código ATC:

C03DA05. (World Health Organization, 2026)

Dosis Diaria Definida:

20mg. (World Health Organization, 2026)

Dosis:

En pacientes con tasa de filtrado glomerular ≥ 60 ml/ min/ 1.73 m^2 la dosis es de 20 mg al día. (Bayer AG, 2022)

Vía de administración:

Oral.

Indicaciones de uso:

Finerenona está indicado para el tratamiento en adultos para la enfermedad renal crónica (con albuminuria) asociada a diabetes tipo 2. (Bayer AG, 2022)

Reacciones adversas:

>10%:

Hipercalemia (14%) (Medscape, 2024 a.).

1-10%:

Hipotensión (4.6%)

Hiponatremia (1.3%)

Insuficiencia cardíaca:

Deterioro de la función renal (7%)

Disminución de la tasa de filtrado glomerular (5%)

Lesión renal aguda (4%)

Insuficiencia renal (3%)

Hospitalizaciones por eventos asociados al empeoramiento de la función renal (2%)
(Medscape, 2024 a.)

Precauciones de uso:

Hipercalemia: algunos pacientes presentan un riesgo incrementado de desarrollar hipercalemia. Entre los factores que aumentan este riesgo se incluyen una tasa de filtrado glomerular reducida, niveles séricos elevados de potasio y antecedentes de episodios previos de hipercalemia. En estos casos, se recomienda realizar una monitorización más estrecha. El tratamiento con finerenona no debe iniciarse si el potasio sérico es superior a 5 mmol/l (Bayer AG, 2022).

Enfermedad renal crónica asociada a DM2: cuando el potasio sérico se encuentra entre 4.8 y 5 mmol/l, puede considerarse el inicio del tratamiento con finerenona, siempre que se realice una monitorización adicional del potasio durante las primeras 4 semanas, ajustando la vigilancia según las características del paciente y sus valores basales. Si el potasio sérico supera los 5.5 mmol/l, el tratamiento con finerenona debe suspenderse y se deben aplicar las recomendaciones locales para el manejo de la hipercalemia.

Una vez que el potasio sérico desciende a ≤ 5 mmol/ l, es posible reiniciar la finerenona a una dosis de 10 mg una vez al día. (Bayer AG, 2022)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al principio activo

Tratamiento concomitante con inhibidores potentes de CYP3A4

Insuficiencia adrenal. (Medscape, 2024 a.)

Interacciones:

Contraindicados:

Atazanavir, cloranfenicol, claritromicina, cobicistat, conivaptán, darunavir, elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato, pomelo, idealisib, itraconazol, ketoconazol, levoketoconazol, lonafarnib, lopinavir, mifepristona, nefazodona, nelfinavir, nirmatrelvir/ritonavir, posaconazol, ritonavir, rucaparib, estiripentol, tipranavir y voriconazol. (Medscape, 2026 b.)

Serías:

Apalutamida, armodafinilo, bexaroteno, bosentán, butalbital, carbamazepina, clobazam, dabrafenib, efavirenz, elagolix, encorafenib, enzalutamida, acetato de eslicarbazepina, etravirina, fosfenitoína, ivosidenib, fenobarbital, fenitoína, primidona, rifabutina, rifampicina, rifapentina, sotorasib, hierba de San Juan y telotristat etilo. (Medscape, 2026 b.)

Supervisar de cerca:

Acetaminofén, acetaminofén IV, acetaminofén rectal, albuterol, albuterol inhalado, alprazolam, amilorida, amiodarona, amlodipina, aprepitant, arformoterol, atorvastatina, azelastina, benazepril, betametasona, betametasona tópica, bicalutamida, bortezomib, bromocriptina, canaglifozina, captopril, ceritinib, cimetidina, ciprofloxacina, clemastina, clotrimazol, cocaína tópica, crizotinib, crofelemer, ciclosporina, danazol, darifenacina, dasatinib, desvenlafaxina,

dexmedetomidina, diazepam, diazepam bucal, diclofenaco, diclofenaco tópico, dihidroergotamina, dihidroergotamina inhalada, dihidroergotamina intranasal, diltiazem, disulfiram, docetaxel, doxorubicina, doxorubicina liposomal, dronedarona, drospirenona, enalapril, enasidenib, entacapona, eplerenona, ergotamina, eritromicina base, eritromicina etilsuccinato, eritromicina lactobionato, eritromicina estearato, etinilestradiol, etopósido, fedratinib, felodipina, fentanilo, fentanilo intranasal, fentanilo iontoforético transdérmico, fentanilo transdérmico, fentanilo transmucoso, fluconazol, fluoxetina, fluvastatina, fluvoxamina, formoterol, fosamprenavir, fosaprepitant, fosinopril, fostamatinib, givinostat, gliburida, heparina, hidralazina, ibrexafungerp, ifosfamida, iloperidona, imatinib, irbesartán, isoniazida, isradipina, istradefilina, ivacaftor, lansoprazol, lapatinib, larotrectinib, lefamulin, lenvatinib, letermovir, levalbuterol, lidocaína, lisinopril, lomustina, losartán, lovastatina, lurasidona, mefloquina, mestranol, metadona, metimazol, metoxsaleno, metilprednisolona, metronidazol, micafungina, midazolam, milsaperidona, mirtazapina, mitoxantrona, moexipril, netupitant/palonosetrón, nevirapina, nicardipina, nifedipina, nilotinib, nisoldipina, nizatidina, olanzapina, olanzapina/samidorfán, omeprazol, orfenadrina, oxibutinina, oxibutinina tópica, oxibutinina transdérmica, palbociclib, pantoprazol, paroxetina, pazopanib, pentamidina, perindopril, pilocarpina, pimoza, pitolisant, fosfato ácido de potasio, bicarbonato de potasio, cloruro de potasio, citrato de potasio, citrato de potasio/ácido cítrico, pravastatina, prednisolona, primaquina, progesterona gel intravaginal, progesterona micronizada, progesterona natural, propofol, quinapril, quinidina, quinina, rabeprazol, ramipril, ranitidina, ranolazina, ribociclib, risperidona, rufinamida, schisandra, selegilina, selegilina transdérmica, selpercatinib, sirolimus, espironolactona, succinilcolina, sulconazol, angiotensina II humana sintética, tacrolimus, tamoxifeno, temsirolimus, tenipósido, testosterona, testosterona bucal, testosterona tópica, tetraciclina, ticagrelor, trandolapril, tranilcipromina, trazodona, triamtereno, trimetoprim, ácido valproico, verapamilo, viloxazina, vinblastina, vincristina, vinorelbina, voclosporina, zafirlukast, zileutón y ziprasidona. (Medscape, 2026 b.)

Menores:

Acetazolamida, anastrozol, ciclofosfamida, drospirenona y patiromer (Medscape, 2026 b.)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

No hay datos del uso de finerenona en mujeres embarazadas.

No se recomienda el uso de finerenona durante el embarazo a no ser que la situación clínica de la mujer requiera tratamiento con finerenona. Si la mujer queda embarazada mientras está tomando finerenona, debe ser informada de los posibles riesgos para el feto (Bayer AG, 2022).

Lactancia:

Se desconoce si la finerenona se excretan en la leche materna.

No se puede excluir el riesgo en recién nacidos/niños.

Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento de finerenona, tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre (Bayer AG, 2022).

Referencias bibliográficas:

Bayer AG. (16 de Febrero de 2022). *Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios*. Recuperado el Junio de 2026, de Finerenona 10mg: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1211616002/FT_1211616002.html#4.
8

Departamento de Farmacoterapia/Dirección Terapéutica Central. (Abril de 2026). *Instituto Guatemalteco de Seguridad Social*. Recuperado el Junio de 2026, de Finerenona 20 mg: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2026/07/Actualizacion-al-Listado-Basico-de-Medicamento-Abril-2026-1.pdf>

Medscape. (2024 a.). *Medscape*. Recuperado el Junio de 2026, de Finerenona: <https://reference.medscape.com/drug/kerendia-finerenone-4000168#0>

Medscape. (Julio de 2026 b.). *Medscape*. Recuperado el Julio de 2026, de finerenona : <https://reference.medscape.com/drug/kerendia-finerenone-4000168>

World Health Organization. (21 de Enero de 2026). *WHO Collaboring Centre for Drug Statistics Methodology*. Recuperado el Junio de 2026, de Finerenona: https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=C03DA05