

Vacuna contra Influenza, solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada

Nivel de prescripción:

III

Código institucional:

2089

Principio Activo:

Vacuna contra influenza. (World Health Organization, 2024)

Forma farmacéutica:

Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado.

Concentración:

No aplica.

Código ATC:

J07BB03. (World Health Organization, 2024)

Dosis Diaria Definida:

No aplica. (World Health Organization, 2024)

Dosis:

Adultos: Administrar 0.5 ml.

Población pediátrica:

Niños a partir de 36 meses: 0.5 ml.

Niños de 6 meses a 35 meses: Pueden administrarse dosis de 0.25 ml o 0.50 ml.

Para niños que no hayan sido previamente vacunados, se recomienda administrar una segunda dosis, dejando como mínimo un período de tiempo de 4 semanas.

Niños menores de 6 meses: No se ha establecido la seguridad y eficacia, no se dispone de datos. (Mylan IRE Healthcare Limited, 2021)

Vía de administración:

Intramuscular.

Indicaciones de uso:

Profilaxis de la gripe, especialmente aquellas personas que presenten un riesgo mayor de complicaciones asociadas. (Mylan IRE Healthcare Limited, 2021)

Reacciones adversas:

Frecuentes:

Dolor de cabeza, sudoración, mialgia, artralgia, fiebre, malestar, escalofríos, fatiga, reacciones locales: enrojecimiento, inflamación, dolor, equimosis, induración.

Frecuencia no conocida:

Trombocitopenia transitoria, linfadenopatía transitoria, reacciones alérgicas que conducen a shock en muy raras ocasiones, angioedema, neuralgia, parestesia, convulsiones febriles, trastornos neurológicos, tales como encefalomielitis, neuritis y síndrome de Guillain Barré.

Vasculitis relacionada en casos muy raros con afectación renal transitoria, reacciones cutáneas generalizadas, que incluyen prurito, urticaria o rash inespecífico. (Mylan IRE Healthcare Limited, 2021)

Precauciones de uso:

No administrar por vía intravascular, en ninguna circunstancia.

Está destinada a proporcionar protección contra aquellas cepas de virus a partir de las cuales se prepara la vacuna y contra cepas estrechamente relacionadas.

La respuesta de anticuerpos en pacientes con inmunosupresión endógena o yatrogénica puede ser insuficiente. (Mylan IRE Healthcare Limited, 2021)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a los principios activos, o a alguno de los excipientes o a cualquier componente que pudiera estar presente en trazas. (Mylan IRE Healthcare Limited, 2021)

Interacciones:

Puede administrarse simultáneamente con otras vacunas, pero debe realizarse en extremidades distintas. Debe tenerse en cuenta que las reacciones adversas pueden intensificarse.

La respuesta inmunológica puede verse disminuida si el paciente está siguiendo un tratamiento inmunosupresor.

Tras la vacunación, se han observado falsos positivos en pruebas serológicas ELISA para detectar anticuerpos frente a virus de inmunodeficiencia humana tipo 1, virus de hepatitis C y, en particular, virus linfotrópico de células T humano tipo 1. Mediante Western Blot pueden desenmascarse los resultados falsos positivos del test ELISA. Estos falsos positivos transitorios podrían ser debidos a la respuesta inmunoglobulina M de la vacuna. (Mylan IRE Healthcare Limited, 2021)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Se pueden utilizar en todos los estadios del embarazo.

Lactancia:

Puede administrarse durante la lactancia. (Mylan IRE Healthcare Limited, 2021)

Referencias bibliográficas:

Mylan IRE Healthcare Limited. (2021, Junio). *Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios*. Recuperado Febrero 2024, from Vacuna contra influenza (suspensión inyectable jeringa precargada (vacuna antigripal inactivada de antígenos):
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/57523/FT_57523.html.pdf

World Health Organization. (2024, Enero 26). *WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology*. Recuperado Febrero 2024, from Influenza, inactivated, split virus or surface antigen:
https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=J07BB03