

Bromoprida, cápsula, 10 mg

Nivel de prescripción:

II

Código institucional:

1992

Principio activo:

Bromoprida. (World Health Organization, 2024)

Forma farmacéutica:

Cápsula.

Concentración:

10 mg.

Código ATC:

A03FA04. (World Health Organization, 2024)

Dosis Diaria Definida:

20 mg. (World Health Organization, 2024)

Dosis:

Tomar 1 capsula cada 12 u 8 horas. Máximo 60 mg al día. (Sanofi Medley, 2024)

Vía de administración:

Oral.

Indicaciones de uso:

Tratamiento de nausea y vómitos incluyendo posoperativo. Disturbios de la motilidad gástrica. Reflujo gastroesofágico y preparación para endoscopias y estudios radiográficos del tracto gastro intestinal. (Sanofi Medley, 2024)

Reacciones adversas:

Más del 10%:

Somnolencia, cansancio, inquietud

Frecuentemente no definidos:

Insomnio, cefalea, náusea, síntomas extrapiramidales, galactorrea, erupciones cutáneas. (Sanofi Medley, 2024)

Precauciones de uso:

Se debe utilizar con precaución en pacientes con glaucoma, diabetes mellitus, enfermedad de Parkinson, insuficiencia renal y presión alta.

Debe utilizarse con precaución en pacientes alérgicos a los neurolépticos (antipsicóticos).

En pacientes con feocromocitoma puede desencadenar crisis hipertensivas.

En pacientes epilépticos puede causar síndromes extrapiramidales.

La dosis podrá necesitar un ajuste en personas diabéticas ya que puede producir hipoglicemias.

Puede aumentar los niveles de prolactina, es importante utilizarlo con precaución en pacientes con Cáncer de mama. (Sanofi Medley, 2024)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al compuesto.

Pacientes con estimulación de la motilidad gastrointestinal como presencia de hemorragia gastrointestinal, obstrucción intestinal mecánica, pacientes epilépticos que estén consumiendo drogas que causen efectos extrapiramidales, pacientes con feocromocitoma. (Sanofi Medley, 2024)

Interacciones:

Contraindicado, evitar la combinación:

Drogas anticolinérgicas y analgésicos narcóticos.

Monitorear de cerca:

Digoxina, paracetamol, tetraciclinas, levodopa, etanol. (Sanofi Medley, 2024)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Categoría C en el embarazo. Se recomienda precaución.

Lactancia:

No existe información sobre la presencia del fármaco en la leche materna, sus efectos en la lactancia y/o lactante. Se recomienda precaución. (Sanofi Medley, 2024)

Referencias bibliográficas:

Sanofi Medley. (2024). *Agência Nacional de Vigilância Sanitária*. Obtenido de
Bulário Eletronico:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351680651201456/>

World Health Organization. (26 de Enero de 2024). *WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology*. Recuperado Enero de 2023, de Bromoprida:

https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=A03FA04