

Permetrina, emulsión o crema tópica 5%, frasco de 100 a 240 ml

Nivel de prescripción

I

Código institucional:

2034

Principio activo:

Permetrina. (World Health Organization, 2024)

Forma farmacéutica:

Emulsión o crema.

Concentración:

5%.

Código ATC:

P03AC04. (World Health Organization, 2024)

Dosis Diaria Definida:

No aplica. (World Health Organization, 2024)

Dosis:

Se debe aplicar una ligera capa de crema en toda la superficie de la piel desde el cuello hasta la planta de los pies, dejar actuar por 8 a 14 horas y lavar con agua y jabón.

Una única dosis suele ser suficiente, si es necesario repetir el procedimiento en 14 días. (Industria Química y Farmacéutica VIR, S.A., 2018) (UpToDate, 2024)

Vía de administración:

Tópico.

Indicaciones de uso:

Tratamiento tópico de la escabiosis. (Industria Química y Farmacéutica VIR, S.A., 2018) (UpToDate, 2024)

Reacciones adversas:

Del 1 al 10%:

Sensación de quemazón, eritema, prurito, rash, sensación de dolor. (Medscape, a) (UpToDate, 2024)

Precauciones de uso:

Se debe reservar para su uso externo únicamente, no utilizar sobre ojos o mucosas. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua.

Puede exacerbar los síntomas de la sarna temporalmente como picazón, enrojecimiento y edema temporalmente, se debe discontinuar si los síntomas permanecen.

Puede causar reacción asmática. (UpToDate, 2024) (Medscape, b) (Industria Química y Farmacéutica VIR, S.A., 2018)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al compuesto. Heridas abiertas. (UpToDate, 2024) (Medscape, b)

Interacciones:

No se conocen interacciones importantes. (UpToDate, 2024) (Medscape, c)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Se considera categoría B en el embarazo. La absorción sistémica luego de la aplicación tópica es menor del 2%. Se considera el tratamiento preferido para la escabiosis durante el embarazo.

Lactancia:

No se conoce su presencia en la leche materna luego de la aplicación tópica, muestra una absorción limitada en animales por lo que se puede considerar segura durante el periodo de lactancia. (Medscape, d) (UpToDate, 2024)

Referencias bibliográficas:

Industria Química y Farmacéutica VIR, S.A. (Octubre de 2018). *Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios*. Obtenido de Permetrina:

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62971/62971_ft.pdf

Medscape. (a). *Medscape*. Recuperado Enero de 2023, de Permethrin topical:

<https://reference.medscape.com/drug/nix-elimite-permethrin-topical-343503#4>

Medscape. (b). *Medscape*. Recuperado Enero de 2023, de Permethrin topical:

<https://reference.medscape.com/drug/nix-elimite-permethrin-topical-343503#5>

Medscape. (c). *Medscape*. Obtenido de Permethrin topical:

<https://reference.medscape.com/drug/nix-elimite-permethrin-topical-343503#3>

Medscape. (d). *Medscape*. Recuperado Enero de 2023, de Permethrin topical:

<https://reference.medscape.com/drug/nix-elimite-permethrin-topical-343503#6>

UpToDate. (2024). *UpToDate*. Recuperado Enero de 2023, de Permethrin: Drug information: <https://www.uptodate.com/contents/permethrin-drug-information>

World Health Organization. (26 de Enero de 2024). *WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology*. Recuperado Enero de 2023, de Permetrina:

https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=P03AC04