

# Factor de crecimiento epidérmico humano recombinante, polvo liofilizado para uso parenteral, 75 mcg

## Nivel de prescripción

III

## Código institucional:

10395

## Principio activo:

Factor de crecimiento epidérmico humano recombinante. (World Health Organization, 2024)

## Forma farmacéutica:

Polvo Liofilizado para uso parenteral.

## Concentración:

75 mcg.

## Código ATC:

D03AX. (World Health Organization, 2024)

## Dosis Diaria Definida:

No aplica. (World Health Organization, 2024)

## Dosis:

Administrar a razón de 0.075 mg diluidos en 5ml, 3 veces a la semana por vía intralesional hasta observar granulación completa, cierre mediante injerto de la lesión o un máximo de 8 semanas. (Consejo de Salubridad General, 2023)

## Vía de administración:

Perilesional e intralesional.

**Indicaciones de uso:**

Adyuvante para manejo del pie diabético en pacientes con úlceras neuropáticas e isquémicas en estadios 3 y 4 de la clasificación de Warner con un área superior a 1 cm<sup>2</sup> con condiciones tróficas mínimas, ausencia de infección e inflamación. (Consejo de Salubridad General, 2023)

**Reacciones adversas:**

Dolor y ardor en el sitio de aplicación, escalofríos, tremor, infección local y fiebre. (Consejo de Salubridad General, 2023)

**Precauciones de uso:**

Se debe tener precaución al utilizar el fármaco en pacientes con eventos cardiovasculares agudos como: infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular o isquemia transitoria o tromboembolismo así como pacientes con hipertensión arterial severa e historia de trombosis venosa profunda. (Consejo de Salubridad General, 2023)

**Contraindicaciones:**

Hipersensibilidad al compuesto. (Consejo de Salubridad General, 2023)

**Interacciones:**

No se conocen interacciones importantes. (Consejo de Salubridad General, 2023)

**Embarazo y lactancia:**

Embarazo:

Se considera categoría C en el embarazo. No se conoce su disponibilidad luego de la aplicación o los posibles efectos sobre el embarazo y/o el feto.

Lactancia: No se conoce su presencia en la leche materna luego de la aplicación, ni de sus efectos en la producción de leche o el lactante. (Consejo de Salubridad General, 2023)

### **Referencias bibliográficas:**

Consejo de Salubridad General. (28 de Abril de 2023). *Valoración científica y técnica*. Obtenido de Compendio Nacional de Insumos para la Salud versión 2023:

[http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/priorizacion/compendio\\_nacional/CSG\\_280423\\_CNIS.pdf](http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/priorizacion/compendio_nacional/CSG_280423_CNIS.pdf)

World Health Organization. (26 de Enero de 2024). *WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology*. Recuperado Enero de 2023, de Cicatrizantes: [https://atcddd.fhi.no/atc\\_ddd\\_index/?code=D03AX](https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=D03AX)