

# Ácido poliacrílico, gel oftálmico, 0.2%, tubo 10g

**Nivel de prescripción:**

I

**Código institucional:**

1239

**Principio activo:**

Ácido poliacrílico. (World Health Organization, 2024)

**Forma farmacéutica:**

Gel oftálmico.

**Concentración:**

0.2%.

**Código ATC:**

S01XA20. (World Health Organization, 2024)

**Dosis Diaria Definida:**

No aplica. (World Health Organization, 2024)

**Dosis:**

Dependiendo de la gravedad e intensidad de los síntomas, instilar una gota de gel en el saco conjuntival de 3-5 veces al día, o más frecuentemente si se requiere, y antes de acostarse.

Seguridad y eficacia en niños no se ha establecido. (BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, 2020)

**Vía de administración:**

Tópico ocular.

**Indicaciones de uso:**

Tratamiento sintomático del ojo seco. (BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, 2020)

**Reacciones adversas:**

Muy raras: hipersensibilidad, calcificación corneal en pacientes con daño previo en la córnea. (BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, 2020)

Frecuencia desconocida: visión borrosa, picor, sensación de quemazón. (BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, 2020)

**Precauciones de uso:**

Las personas que utilizan lentes de contacto deben quitárselas antes de la administración de este medicamento y deben esperar 15 minutos antes de colocárselas nuevamente. (BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, 2020)

**Contraindicaciones:**

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. (BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, 2020)

**Interacciones:**

No se conocen interacciones. De utilizar otros medicamentos oftalmológicos, administrarse con un intervalo de 15 min y este siempre en último lugar. (BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, 2020)

**Embarazo y lactancia:**

Embarazo:

No se dispone de datos clínicos durante el embarazo. Probablemente el carbómero solo se absorbe en una cantidad muy pequeña y por tanto es de suponer que la exposición es baja.

Lactancia:

No se prevén efectos sobre el niño lactante dado que la exposición sistémica al carbómero de la mujer es insignificante. Se puede utilizar durante el periodo de lactancia. Sin embargo, como norma general, este medicamento no debe ser utilizado durante el embarazo y la lactancia excepto si un médico ha considerado atentamente todos los posibles riesgos y beneficios. (BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, 2020)

### **Referencias bibliográficas:**

BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, 2020. (Noviembre de 2020). Recuperado Septiembre de 2023, de Carbómero: [https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/71342/71342\\_ft.pdf](https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/71342/71342_ft.pdf)

World Health Organization. (23 de Enero de 2023). WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Recuperado Septiembre de 2023, de [https://www.whocc.no/atc\\_ddd\\_index/?code=S01XA20&showdescription=yes](https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=S01XA20&showdescription=yes)