

Carbetocina, solución inyectable 100 mcg/ml, vial o ampolla 1 ml

Nivel de prescripción:

III

Código institucional:

2046

Principio activo:

Carbetocina. (World Health Organization, 2024)

Forma farmacéutica:

Solución inyectable.

Concentración:

1 mg.

Código ATC:

H01BB03. (World Health Organization, 2024)

Dosis Diaria Definida:

0.1 mg. (World Health Organization, 2024)

Dosis:

Cesáreas bajo anestesia epidural, espinal o parto vaginal, 1 ml equivalente a 100 microgramos de carbetocina, bajo supervisión médica en forma lenta (por lo menos durante un minuto.) Debe administrarse posterior a la extracción del recién nacido, de preferencia previo extracción de la placenta. (GP-PHARM , S.A., 2023)

Vía de administración:

Intravenosa o intramuscular.

Indicaciones de uso:

Atonía uterina posterior al parto por cesárea bajo anestesia epidural o espinal.
(Grupo GHEMA (SAFH), 2023)

Reacciones adversas:

Muy Frecuentes: sensación de calor, prurito, dolor de cabeza, hipotensión, náuseas, dolor abdominal, rubor.

Frecuentes: escalofríos, calor, sabor metálico, vómitos, vértigo, anemia, hígado graso, aumento de enzimas hepáticas, hepatitis. (Grupo GHEMA (SAFH), 2023)

Precauciones de uso:

Indicado únicamente para su uso en obstetricia, no debe utilizarse en cualquier fase del embarazo previo extracción del niño ya que la actividad uterotónica persiste varias horas. Se debe vigilar cualquier sangrado vaginal y uterino posterior a su uso. Puede presentar cierta actividad antidiurética, por lo que se debe vigilar al paciente por posible hiponatremia. Usar con precaución en pacientes con asma, migraña, enfermedades cardiovasculares. (GP-PHARM , S.A., 2023)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al medicamento, a Oxitocina o excipientes.

No debe utilizarse antes de la extracción del niño, inducción del parto, insuficiencia hepática o renal, epilepsia, enfermedad cardiovascular grave. (GP-PHARM , S.A., 2023)

Interacciones:

No se tienen estudios respecto a la interacción con carbetocina y analgésicos, espasmolíticos y agentes usados en anestesia epidural o espinal.

No se recomienda el uso de oxitocina, prostaglandinas y agentes argóticos como metilergometrina, en conjunto con carbetocina. (GP-PHARM , S.A., 2023)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Contraindicado durante el embarazo, no debe utilizarse para inducción del parto.

Lactancia: No se recomienda restringir la lactancia posterior a su uso, debido a sus propiedades farmacocinéticas incluyendo semivida y biodisponibilidad. (GP-PHARM, S.A., 2023)

Referencias bibliográficas:

GP-PHARM, S.A. (Mayo de 2023). Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Recuperado Enero de 2024, de Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/79228/FT_79228.html.pdf

Grupo GHEMA (SAFH). (Marzo de 2023). Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. Obtenido de Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA-SAFH): https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media-mediafile_sasdocumento/2023/CARBETOCINA_GFTHA.pdf

World Health Organization. (26 de Enero de 2024). WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Recuperado Enero de 2024, de Carbetocina: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=H01BB03