

Hidrocortisona y cloranfenicol, ungüento oftálmico, 0.1% y 0.1%, tubo 3- 5 g

Nivel de prescripción:

II

Código institucional:

170

Principio activo:

Hidrocortisona, Cloranfenicol. (World Health Organization, 2024)

Forma farmacéutica:

Ungüento oftálmico.

Concentración:

0.1% y 0.1%.

Código ATC:

D07CA01. (World Health Organization, 2024)

Dosis Diaria Definida:

No aplica. (World Health Organization, 2024)

Dosis:

Según criterio médico; aplicar de 2 a 3 veces al día. (ALBIS S.A, 2017)

Vía de administración:

Tópico ocular.

Indicaciones de uso:

Patologías infecciosas e inflamatorias oculares sensibles al cloranfenicol. (ALBIS S.A, 2017)

Reacciones adversas:

Reportados post comercialización: Dermatitis de contacto, eczema, eritema, sarpullido, urticaria, edema generalizado. (ALBIS S.A, 2017)

Precauciones de uso:

No se recomienda utilizar cloranfenicol por más de diez días, se debe evitar el uso concomitante de otras preparaciones tópicas, los niños tienen un riesgo aumentado de padecer una supresión hipotalámica-hipofisaria-adrenal inducida por corticoesteroides, los lactantes pueden desarrollar síndrome gris fetal, los pacientes de la tercera edad poseen un riesgo aumentado de padecer atrofia de la piel causado por corticoesteroides, en pacientes que utilizan lentes de contacto se debe utilizar con precaución, antes de utilizar el medicamento se debe lavar las manos y evitar tocar el aplicador con la superficie ocular para evitar contaminación cruzada, suspender el medicamento si se observan cambios en la visión; el uso prolongado de dexametasona puede causar hipertensión y/o glaucoma, así como daño al nervio óptico, formación de cataratas y defectos visuales.

Los corticoesteroides pueden exacerbar las infecciones purulentas o causadas por parásitos; pueden existir infecciones micóticas luego del uso prolongado de corticoesteroides y se han reportado casos de anemia aplásica y depresión de la médula ósea después del uso de cloranfenicol incluso en aplicaciones tópicas. (ALBIS S.A, 2017)

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad, enfermedades virales incluyendo queratitis por herpes simples y varicela, infección micobacteriana, tuberculosis ocular e hipertensión ocular. (ALBIS S.A, 2017)

Interacciones:

Serio, buscar alternativas:

Macrólidos, clindamicina, tacrolimus, ciclosporina, fármacos con efectos adversos de la hematopoyesis.

Vigilar de cerca:

Anticoagulantes, fenobarbital, fenitoína, sulfonilureas. (ALBIS S.A, 2017)

Embarazo y lactancia:

Embarazo:

Existe información limitada sobre la seguridad del uso del medicamento. Su uso debe ser evaluado por un médico capacitado y si el beneficio supera el riesgo.

Lactancia:

No se conoce si el fármaco es excretado después de su uso ocular. Su uso debe ser evaluado por un médico capacitado y si el beneficio supera el riesgo. (ALBIS S.A, 2017)

Referencias bibliográficas:

ALBIS S.A. (Octubre de 2017). DIGEMID. Recuperado Marzo de 2024, de Hidrocortisona 0,1%, Cloranfenicol 0,1%, solución oftálmica: <https://myhealthbox.eu/web/cache/2819907.pdf>

World Health Organization. (26 de Enero de 2024). WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Recuperado Enero de 2024, de Dexamethasone and antiinfectives: https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=S01CA03&showdescription=yes