Biperideno clorhidrato, tableta, 2 mg, vía oral, código IGSS: 824

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Síndromes Parkinsonianos, especialmente con sintomatología de rigidez muscular y temblor.
Sintomatología extrapiramidal, como distonía aguda, acatisia, acinesia, rigidez, sialorrea, sudoración y síndrome parkinsoniano, provocada por medicamentos.

Reacciones adversas: Excitación, agitación, terror, confusión, delirios, alucinaciones, insomnio, fatiga, mareo, alteraciones en la memoria, taquicardia, sequedad de boca, náuseas, trastornos gástricos, espasmos musculares, cansancio.
Hipersensibilidad, nerviosismo, euforia, cefalea, discinesia, ataxia, alteraciones en el habla, mayor predisposición a epilepsia y convulsiones., trastornos de acomodación, midriasis, fotosensibilidad, glaucoma de ángulo cerrado, bradicardia, estreñimiento, hipohidriosis, erupción alérgica, dificultad para orinar, retención de orina.

Precauciones de uso: En pacientes con:
Hipertrofia de próstata, por la posible retención urinaria provocada por los anticolinérgicos.
Arritmias cardiacas, ya que los anticolinérgicos pueden producir taquicardia.
Epilepsia.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquiera de sus excipientes.
Obstrucción intestinal, megacolon o íleo.
Glaucoma de ángulo cerrado.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.