Budesonida, suspensión nasal de 50 mcg/ aspersión, frasco, 20 ml, Vía inhalación, código IGSS: 1999

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Rinitis alérgica estacional y perenne. Rinitis vasomotora. Tratamiento de los pólipos nasales y su prevención tras polipectomía.

Reacciones adversas: Epistaxis, faringitis, broncoespasmo, tos, irritación nasal.

Precauciones de uso: Pacientes con tuberculosis pulmonar o con infecciones fúngicas o virales de las vías respiratorias.
El uso del pulverizador por más de una persona puede dar lugar a contagios.
En tratamientos de larga duración, debe inspeccionarse la mucosa nasal al menos una vez al año.
En ocasiones puede ser útil la administración simultánea de un colirio antihistamínico para contrarrestar los efectos oculares producidos por la alergia.
Riesgo potencial de enmascarar una infección local.
Puede dar lugar a un resultado positivo en las pruebas de control de dopaje.
Pacientes previamente tratados con esteroides por vía sistémica por posible alteración en la función hipotalámicopituitaria-adrenal.
Se pueden producir alteraciones visuales con el uso sistémico y tópico de corticosteroides.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.