Digluconato de clorhexidina + Fluoruro sódico, colutorio bucal 0.12g + 0.05g en 100 ml, frasco de 200 - 250 ml, vía tópica bucal, código IGSS: 2056

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de enfermedades, periodontales, como infección odontogénica, periodontitis y prevención de caries.

Reacciones adversas: Aumento del sarro bucal, Irritación bucal, bronquitis, sensación alterada del gusto, dolor dental, formación de cálculos.
Estomatitis, gingivitis, glositis, aftas bucales, hiperestesia, descamación, queratinización, mucocele, anafilaxis.

Precauciones de uso: Se han reportado reacciones alérgicas severas incluyendo anafilaxis, se debe parar el tratamiento si se presentan signos de hipersensibilidad. Se ha observado aumento de la incidencia de cálculos subgingivales, se debería realizar profilaxis de los mismos al menos cada 6 meses.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.