Ergotamina en asociación/ (Cafeína), comprimido 1 mg/ (100 mg), vía oral, código IGSS: 954

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de los ataques agudos de migraña con o sin aura.

Reacciones adversas: náuseas y vómitos; úlcera rectal o anal (por uso excesivo de supositorios), parestesia, entumecimiento, debilidad y vértigo, Edema localizado y picor, Pueden ocurrir complicaciones vasoconstrictoras graves, como isquemia, cianosis, ausencia de pulso, extremidades frías, gangrena, malestar y dolor precordial, cambios en el electrocardiograma y dolores musculares.
Ocurre más comúnmente con la terapia a largo plazo en dosis relativamente altas; también informado con dosis normales o a corto plazo.
Otros efectos adversos cardiovasculares incluyen taquicardia transitoria o bradicardia e hipertensión.

Precauciones de uso: Está sólo indicado para el tratamiento de los ataques agudos de migraña y no como tratamiento preventivo.

Evitar uso continuado o dosis superiores a las recomendadas ya que puede producirse vasoespasmo, cambios fibróticos, en particular de la pleura y del retroperitoneo y más raramente de las válvulas cardíacas, fibrosis cardíaca, pulmonar y pleural y ergotismo (entre ellos, casos severos de síntomas de constricción de los vasos sanguíneos periféricos) con posible desenlace mortal.

Precaución en pacientes con anemia, no deben tomar ergotamina pacientes con trastornos hereditarios raros, como intolerancia a la galactosa, deficiencia de lactasa o malabsorción de glucosa-galactosa.

Puede provocar isquemia miocárdica o en casos raros, infarto, debido a sus propiedades vasoconstrictoras, incluso en pacientes sin historia previa conocida de enfermedades coronarias.

Se controlará adecuadamente a los pacientes con insuficiencia hepática leve a moderada, especialmente los pacientes con un cuadro de tipo colestático.

Pacientes geriátricos, ya que son más propensos a sufrir enfermedad vascular periférica oclusiva y, por tanto, a padecer los efectos adversos de la vasoconstricción periférica que los adultos jóvenes. El riesgo de isquemia cardíaca es mayor en estos pacientes.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes

Trastornos circulatorios periféricos, como síndrome de Raynaud, hiertiroidismo, enfermedad vascular obliterante, cardiopatía isquémica, hipertensión mal controlada, estado de sepsis, shock.

Insuficiencia hepática o renal severa.

Arteritis temporal.

Migraña hemipléjica o basilar.

Tratamiento concomitante con antibióticos macrólidos, antirretrovirales inhibidores de la proteasa o de la transcriptasa inversa, antifúngicos azólicos.

Tratamiento concomitante con agentes vasoconstrictores (incluyendo alcaloides del cornezuelo del centeno, sumatriptán, y otros agonistas del receptor 5-hidroxitriptamina.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.