Fenobarbital, tableta, 100 mg, vía oral, código IGSS: 839

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la epilepsia: crisis generalizadas tónico-clónicas y crisis parciales simples.
Tratamiento de convulsiones. Profilaxis y tratamiento de crisis convulsivas.
Tratamiento a corto plazo del insomnio; en caso de que se utilice para esta indicación, no se recomienda su uso a largo plazo ya que pierden su efectividad en la inducción y mantenimiento del sueño de 2 semanas o menos de tratamiento.

Reacciones adversas: Depresión respiratoria**,** Ataxia, mareo, somnolencia, disartria, fatiga, dolor de cabeza, irritabilidad, nistagmo, Inquietud parestesia, vértigo, pacientes geriátricos: Excitación, confusión, depresión, Pacientes pediátricos: excitación paradójica/hiperactividad, Embotamiento mental, constipación, diarrea, náuseas, vómitos, anemia megaloblástica (deficiencia de folato), Erupción, hipocalcemia, hepatotoxicidad, Síndrome de Stevens-Johnson, raquitismo, osteomalacia.

Precauciones de uso: El uso concomitante de productos con fenobarbital, y opioides puede provocar sedación profunda, depresión respiratoria, coma y muerte.

Reserva prescripción concomitante de estos medicamentos para pacientes para en quienes las opciones de tratamiento alternativas son inadecuadas.

Si se toma una decisión para el uso concomitante de estos medicamentos, limite las dosis y duraciones al mínimo requerido, y seguir a los pacientes en busca de signos y síntomas de depresión respiratoria y sedación.

Reacciones dermatológicas graves: graves y, en ocasiones, mortales reacciones de hipersensibilidad, incluyendo necrólisis epidérmica tóxica y síndrome de Stevens-Johnson, debería interrumpirse ante el primer signo de sarpullido, a menos que el sarpullido sea claramente no relacionado con el medicamento.

Reacción a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos

Hipersensibilidad multiorgánica pueden ser mortal o potencialmente mortal en pacientes que toman medicamentos antiepilépticos; si hay signos o síntomas de eosinofilia y síntomas sistémicos evalúe al paciente inmediatamente. Suspender si una etiología alternativa no puede ser establecida.

Puede causar daño tisular con necrosis; evitar la extravasación perivascular o la inyección intraarterial.

Detenga fenobarbital si hay evidencia de dolor, hinchazón, decoloración o cambio de temperatura en la extremidad.

Evite el uso concomitante de fenobarbital en pacientes que tienen un riesgo significativo de desarrollar torsade de pointes y con productos que pueden aumentar el riesgo de prolongación del intervalo QTc o productos que puedan aumentar las concentraciones de fenobarbital.

Puede aumentar el riesgo de pensamientos o conductas suicidas en adolescentes y adultos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo y excipientes.
Porfiria aguda.
Administración intraarterial o subcutánea.
Insuficiencia hepática grave.
Disnea u obstrucción de las vías respiratorias.
Antecedentes de reacción de hipersensibilidad al fenobarbital u otros barbitúricos.
Antecedentes de adicción a sedantes hiponóticos.
Pacientes nefríticos (grandes dosis).
Embarazo/ lactancia.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.