Fosfato de sodio de 12 mmol fosfato y 20 mmol Na, Ampolla 20 ml, Vía oral o enteral, código IGSS: 1983

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Hipofosfatemia asociada con raquitismo resistente a la vitamina D y osteomalacia hipofosfatémica resistente a vitamina D.

Reacciones adversas:

Nefroclacinosis (nefropatía aguda por fosfato) que puede llegar a fallo renal agudo, náusea, vómitos diarrea, dolor abdominal, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipocalcemia, hipernatremia.

Precauciones de uso: Se deben vigilar las concentraciones de calcio y fosfato en sangre, así como la excreción de calcio urinario, con el fin de evitar en lo posible el desarrollo de hipercalcemia e hipercalciuria

La administración concomitante de fosfato sódico y glucocorticoides, mineralcorticoides, corticotropina, esteroides anabolizantes o andrógenos, puede dar lugar a edema debido al sodio que contienen. Su utilización con medicamentos que contienen calcio, incluyendo suplementos dietéticos y antiácidos, puede aumentar el riesgo de depósitos de calcio en tejidos blandos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.