Hidróxido de aluminio y magnesio, suspensión 185 mg – 200 mg/ 5 ml, frasco 360 ml, vía oral, código IGSS: 200

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento para sintomático intermitente de trastornos de hipersecreción gástrica, incluyendo dispepsia.

Reacciones adversas: Constipación, impacto fetal, sabor a tiza, dolor abdominal. Nausea, vómitos, intoxicación por aluminio, hipofosfatemia, osteomalacia, diarrea, hipermagnesemia.

Precauciones de uso: El fármaco debe utilizarse por tiempo limitado, la terapia prolongada puede resultar en hipofosfatemia al disminuir su absorción por el tracto GI.
Se debe tener precaución al usar en pacientes con falla renal, puede ocurrir hipermagnesemia o intoxicación por aluminio.
Si se automedica debe restringirse a 14 días de uso como máximo.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto, insuficiencia renal, obstrucción intestinal.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.