Lidocaína, parche transdérmico 5%, en sobre o sachet, vía transdérmico, código IGSS: 10376

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Indicado para el alivio temporal del dolor en adultos y adolescentes mayores de 12 años; así como para el alivio del dolor asociado con la neuralgia post-herpética.

Reacciones adversas: Las reacciones alérgicas y anafilactoides (raras) pueden caracterizarse por angioedema, broncoespasmo, dermatitis, disnea, hipersensibilidad, laringoespasmo, prurito, shock y urticaria.
Pueden ocurrir reacciones en el sitio de aplicación (como por ejemplo ampollas, hematomas, sensación de ardor, despigmentación, dermatitis, decoloración, edema, eritema, exfoliación, irritación, pápulas, petequias, prurito, vesículas o sensación anormal).

Precauciones de uso: La insuficiencia hepática grave puede disminuir la eliminación sistémica de la lidocaína.
Tener en cuenta el potencial de sensibilidad cruzada en pacientes alérgicos a los derivados del ácido paraaminobenzóico, especialmente si el agente etiológico es incierto.
La aplicación en piel lesionada o inflamada, puede resultar en concentraciones sanguíneas más altas de lidocaína debido a una mayor absorción; es por ello que solo debe aplicarse solo sobre la piel intacta.
Si se produce irritación o sensación de ardor durante la aplicación, aconseje a los pacientes que se quiten el parche y no vuelvan a aplicar hasta que la irritación desaparezca.

Cuando se usa concomitantemente con otros productos que contienen agentes anestésicos locales, se debe considerar la cantidad de lidocaína absorbida de todas las formulaciones.

Si se produce contacto con los ojos, lave inmediatamente los ojos con agua o solución salina y protéjalos hasta que vuelva la sensibilidad.

Las fuentes de calor externas, la aplicación de mayor duración, la aplicación de más parches de los recomendados, los pacientes más pequeños, la eliminación alterada pueden contribuir a aumentar la absorción sistémica del parche transdérmico; asesorar a los pacientes sobre la aplicación y la duración adecuadas.

Contraindicaciones: Historia conocida de sensibilidad a los anestésicos locales de tipo amida, o a cualquier otro componente del producto.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.