Melatonina, tableta, 5 mg, Vía oral, código IGSS: 10387

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento a corto plazo del desfase horario (jet lag) en adultos.

Reacciones adversas: Calambres abdominales, el estado de alerta disminuyó, alteración del ritmo circadiano, fatiga diurna, depresión (transitoria), mareo, somnolencia, disforia en pacientes deprimidos, dolor de cabeza, irritabilidad.

Precauciones de uso: Puede ocasionar somnolencia.
El uso concomitante con Warfarina y nuevos anticoagulantes de acción directa puede aumentar el riesgo de sangrado.
Tomar al menos 2 horas antes y 2 horas después de una comida, pacientes diabéticos o con alteración significativa en la tolerancia a la glucosa deben tomar al menos 3 horas después de una comida.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.
Tratamiento inmunosupresor concurrente, pacientes con insuficiencia renal crónica.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.