Miconazol nitrato, crema 2 %, tubo, 30 g, vía tòpico, código IGSS: 2033

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de hongos e infecciones en piel.
Dermatofitosis: tinea pedis, corporis, cruris, manuum, unguium, barbae.
Afecciones debidas a levaduras: intertrigo candidiásico; lesiones perianales; onixis y perionixis; estomatitis angular; balanopostitis; candidiasis anal, vulvar y escrotal en niños y prematuros; vulvovaginitis candidiásica posantibiótica.

Reacciones adversas: Irritación, incendio, maceración, dermatitis alérgica de contacto.

Precauciones de uso: Sólo para uso externo. No debe aplicarse en la conjuntiva ocular. No se use simultáneamente con otro antimicótico de uso tópico, para evitar el riesgo de resistencia al fármaco. Si aparecen signos de irritación química, descontinúe el uso del medicamento.
Insuficiencia hepática: usar con precaución.
Porfiria aguda: incrementa el riesgo de toxicidad. Requiere monitoreo regular de hemoglobina, hematócrito, electrólitos séricos y lípidos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida al miconazol o algún otro componente del grupo de los imidazoles.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.