Orfenadrina, tableta o cápsula, 100 mg, vía oral, código IGSS: 882

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de espasmos musculares y dolor muscular.

Reacciones adversas: Palpitaciones, taquicardia, agitación, confusión, mareo, euforia, alucinaciones, cefalea, prurito, urticaria, constipación, irritación gástrica, nausea, vómitos, xerostomía, retención urinaria, hipersensibilidad, tremor, debilidad, visión borrosa, aumento de la presión intraocular, midriasis, nistagmo, congestión nasal, boca seca, sincope, anemia aplásica.

Precauciones de uso: Puede causar depresión del sistema nervioso y ocasionar disminución de las habilidades mentales y físicas.
Debe utilizarse con precaución en pacientes con historia de abuso de drogas, la euforia puede ocurrir incluso a dosis terapéuticas y potenciar el riesgo de abuso.
Se debe usar con precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular.
Se debe usar con precaución en pacientes con diarrea, uropatía obstructiva parcial, glaucoma de ángulo abierto e insuficiencia hepática y renal.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto. Pacientes sin asistencia ventilatoria. Enfermedad neuromuscular.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.