Oxibutinina clorhidrato, tableta 5 mg, Vía oral, código IGSS: 1124

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Está indicado para el tratamiento sintomático de la incontinencia urinaria de urgencia y/o del aumento de la frecuencia urinaria tal y como pueden ocurrir en pacientes con vejiga inestable.
Está indicado en niños de 5 años o mayores para: incontinencia urinaria, urgencia y aumento de la frecuencia urinaria en niños con vejiga inestable debido a vejiga hiperactiva idiopática o disfunción neurógena de la vejiga (hiperactividad del detrusor); enuresis nocturna asociada con hiperactividad del detrusor, junto con tratamiento no farmacológico, cuando otro tratamiento ha fallado.

Reacciones adversas: Boca seca, estreñimiento, somnolencia, náuseas, astenia, mareos, dolor de cabeza, visión borrosa, ojos secos, diarrea, náuseas, dolor, rinitis, anorexia, retención de líquidos, sofocos, disfonía, disfagia, movimientos intestinales frecuentes, malestar en el pecho, sed, cicloplejía, alteración de la alerta mental, pérdida de memoria, midriasis, taquicardia, prolongación del intervalo QT, alucinaciones, confusión, delirio, infección del tracto urinario, palpitaciones, congestión nasal, hipertensión.
Usa concomitante con carbamazepina: vómitos, somnolencia, inestabilidad, habla confusa, nistagmo.

Precauciones de uso: Debe utilizarse con precaución en pacientes con enfermedad de Parkinson que tienen mayor riesgo de aparición de reacciones adversas al producto, así como en pacientes con neuropatías autonómicas, trastornos graves de la motilidad gastrointestinal, insuficiencia renal o hepática.

Los fármacos anticolinérgicos, como la oxibutinina pueden disminuir la motilidad gastrointestinal y deben usarse con precaución en pacientes con trastornos obstructivos gastrointestinales, atonía intestinal y colitis ulcerativa.

Debe utilizarse con precaución en pacientes con obstrucción vesical clínicamente significativa ya que los fármacos anticolinérgicos podrían agravar esta obstrucción y causar retención urinaria.

Si existiera una infección del tracto urinario se debería instaurar un tratamiento antibacteriano adecuado.

Puede agravar trastornos cognitivos, síntomas de hipertrofia prostática y taquicardia (por ello se debe utilizar con precaución en caso de hipertiroidismo, insuficiencia cardiaca congestiva, arritmias cardíacas, enfermedad cardíaca coronaria e hipertensión). Se debe utilizar con precaución en pacientes con deterioro cognitivo.

Se han notificado efectos anticolinérgicos del sistema nervioso central (ej: alucinaciones, agitación, confusión, visión borrosa, somnolencia). Debe informarse a los pacientes que el alcohol puede aumentar la somnolencia. Se recomienda monitorizar al paciente, especialmente en los primeros meses de iniciar el tratamiento o de aumentar la dosis. Se debe considerar la interrupción del tratamiento o la reducción de la dosis si aparecen efectos anticolinérgicos del sistema nervioso central.

El uso de oxibutinina se ha asociado con eventos anticolinérgicos del sistema nervioso central y eventos psiquiátricos, tales como trastornos del sueño (ej. insomnio) y trastornos cognitivos, especialmente en pacientes de edad avanzada.

Se debe tener precaución cuando se administra junto con otros medicamentos anticolinérgicos.

Cuando se utiliza en pacientes con fiebre o en temperaturas ambientales elevadas, se puede producir postración por calor debido a una menor sudoración.

Puede llevar a una disminución de la secreción de saliva que podría dar como resultado la formación de caries dentales, periodontitis o candidiasis oral.

Deben utilizarse con precaución en pacientes que tengan hernia de hiato/reflujo gastroesofágico y/o que estén tomando fármacos (como los bifosfonatos), que pueden producir o exacerbar la esofagitis.

Se ha observado dependencia en pacientes con antecedentes de abuso de sustancias.

Pacientes de edad avanzada: debe ser utilizado con precaución, podría ser más sensible a los anticolinérgicos de efecto central y mostrar diferencias en la farmacocinética. Esta población también es más sensible a las reacciones adversas al producto.

Población pediátrica:

Niños menores de 5 años: no se recomienda el uso en niños menores de 5 años debido a la falta de datos sobre seguridad y eficacia. Existe evidencia limitada que sustenta la utilización de oxibutinina en niños con enuresis nocturna monosintomática (no relacionada con hiperactividad del detrusor).

Niños de 5 años o mayores: debe utilizarse con precaución ya que podrían ser más sensibles a los efectos de este medicamento, en particular a las reacciones adversas sobre sistema nervioso central y efectos psiquiátricos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Pacientes con obstrucción vesical en los cuales se puede desencadenar una retención urinaria. Alteraciones gastrointestinales de tipo obstructivo, atonía intestinal o íleo paralítico. Megacolon tóxico. Colitis ulcerosa grave. Miastenia gravis. Glaucoma de ángulo estrecho o en pacientes con poca profundidad en la cámara anterior.

Urgencia urinaria frecuente y mayor micción por la noche causada por enfermedad cardíaca o renal.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.