Clorhidrato de Piridoxina, Succinato de Doxilamina, tableta con cubierta entérica 10 mg/ 10 mg, vía oral, código IGSS: 10389

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de las náuseas y los vómitos del embarazo en mujeres que no responden al manejo conservador.

Reacciones adversas: Somnolencia.

Precauciones de uso: Evite participar en actividades que requieren un estado de alerta completa, debido a que clorhidrato de piridoxina + succinato de doxilamina pueden causar somnolencia.
No está recomendado su uso si la paciente está utilizando depresores del sistema nervioso central.
El medicamento tiene propiedades anticolinérgicas y, por lo tanto, debe usarse con precaución en mujeres con: aumento presión intraocular, glaucoma de ángulo estrecho, úlcera péptica estenosante, obstrucción piloroduodenal y obstrucción del cuello vesical.
Pruebas de orina falsas positivas para detección metadona, opiáceos y fenciclidina con uso de succinato de doxilamina/clorhidrato de piridoxina.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los principios activos o excipientes.
Uso concomitante con inhibidores de la monoaminooxidasa.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.