Citrato Potásico, Tableta o cápsula de liberación prolongada 10 mEq, Vía oral, código IGSS: 10397

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de pacientes con litiasis renal e hipocitraturia, formadores crónicos de cálculos de oxalato cálcico, fosfato cálcico. - Litiasis de ácido úrico solo o acompañada de litiasis cálcica.
Acidosis tubular con nefrolitiasis cálcica.

Reacciones adversas: Pueden presentarse trastornos gastrointestinales leves que pueden ser paliados mediante la administración conjunta de alimentos.
En pacientes con el mecanismo de excreción de potasio alterado, puede producirse hiperpotasemia. Se aconseja no sobrepasar las dosis recomendadas ya que en pacientes con insuficiencia renal podría producirse hiperpotasemia.

Precauciones de uso: Se recomienda que los pacientes sigan un régimen asódico e incrementen la ingestión de líquidos. El citrato potásico se incluye en comprimidos de matriz de cera que permite la liberación lenta del citrato potásico. Es probable, que una vez la matriz cérea esté vacía se elimine intacta por las deposiciones de forma aún visible.
Los comprimidos deben ser tragados enteros con suficiente cantidad de líquidos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
Insuficiencia renal.
Infecciones urinarias persistentes alcalinas.

Obstrucción del tracto urinario.
Hiperpotasemia.
Insuficiencia adrenal.
Alcalosis respiratoria o metabólica.
Ulcera péptica activa.
Obstrucción intestinal.
Pacientes sometidos a terapia anticolinérgica.
Pacientes con vaciado gástrico lento.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.