Difenidol, tableta, 25 mg, vía oral, código IGSS: 950

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Nausea y vómitos asociados a vértigo. Cinetosis. Prevención y control de nausea en enfermedad de Ménieré, laberintitis y cirugía del oído medio.

Reacciones adversas: Somnolencia, visión borrosa, cefalea, intranquilidad, cansancio o debilidad, dificultad para dormir, dolor abdominal, resequedad de boca, erupción cutánea, alucinaciones visuales y auditivas, desorientación, confusión.

Precauciones de uso: El fármaco puede ocasionar alucinaciones o confusión, es importante limitar su uso a pacientes hospitalizados o supervisión continua y por un máximo de 6 meses.
Su uso puede ocultar síntomas de intoxicación medicamentosa, obstrucción intestinal o tumor cerebral.
Se debe usar con precaución con pacientes que consumen depresores del sistema nervioso central y atropínicos.
Se debe utilizar con precaución con pacientes con insuficiencia renal.
Posee un leve efecto anticolinérgico periférico, se debe utilizar con precaución en pacientes con glaucoma, lesiones obstructivas del tracto gastrointestinal o genitourinario.
No se recomienda utilizar como tratamiento de nauseas o vómitos en el embarazo.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto. Enfermedad obstructiva gastrointestinal o genitourinaria, hipotensión, glaucoma, hipotensión arterial, insuficiencia renal.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.