Hidroxizina, tableta, 25 mg, Vía oral, código IGSS: 1349

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Alivio sintomático de la ansiedad y la tensión asociadas con la psiconeurosis y como complemento en estados patológicos orgánicos en los que se manifiesta ansiedad.
Tratamiento del prurito debido a condiciones alérgicas como urticaria crónica y dermatosis atópicas y de contacto, y en el prurito mediado por histamina.
Sedante cuando se usa como premedicación y después de anestesia general.

Reacciones adversas: boca seca**, s**omnolencia (normalmente transitoria y puede desaparecer a los pocos días de continuar el tratamiento o al reducir la dosis), actividad motora involuntaria (temblor, convulsiones) normalmente con dosis considerablemente superiores a las recomendadas. No se ha informado depresión respiratoria clínicamente significativa a las dosis recomendadas.

Precauciones de uso: Reevaluar periódicamente la utilidad del fármaco para cada paciente. Cuando se administran depresores del sistema nervioso central concomitantemente con hidroxizina, se debe reducir su dosis.

Desaconsejar el uso simultáneo de otros fármacos depresores del sistema nervioso central y se debe advertir que el efecto del alcohol puede aumentar. Se han notificado casos de prolongación del QT y Torsade de Pointes durante el uso poscomercialización de hidroxizina.
En raras ocasiones, la hidroxizina puede causar pustulosis exantemática generalizada. Los sedantes pueden causar confusión y sedación excesiva en los ancianos; pacientes de edad avanzada en general

El tratamiento debe iniciarse con dosis bajas y observarse estrechamente.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad documentada o producto relacionado que incluye cetirizina y levocetirizina y componentes de la formulación.
Intervalo QT prolongado.
Administración subcutánea, intraarterial o intravenosa.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.