# Metoprolol, tableta, 100 mg, vía oral, código IGSS: 646

**Dosis:** Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

**Indicaciones de uso:** Tratamiento de la hipertensión, para bajar la presión arterial.
Tratamiento a largo plazo de la angina de pecho, para reducir los ataques de angina y mejorar la tolerancia al ejercicio.
Tratamiento de pacientes hemodinámicamente estables con sospecha o certeza de infarto agudo de miocardio para reducir la mortalidad cardiovascular cuando se utiliza solo o junto con metoprolol intravenoso.

**Reacciones adversas:** Mareos, dolor de cabeza, cansancio, depresión, diarrea, prurito, bradicardia, erupción, disnea, extremidades frías, estreñimiento, dispepsia, insuficiencia cardíaca, hipotensión, náuseas, flatulencia, acidez estomacal, xerostomía, sibilancias, broncoespasmo.

**Precauciones de uso:** La interrupción brusca puede exacerbar la isquemia miocárdica.
Puede ocurrir un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca.
Los pacientes con enfermedad broncoespástica, en general, no deben recibir betabloqueantes.
Iniciar terapia con un bloqueador alfa en pacientes con feocromocitoma.
Evite el inicio de dosis altas de metoprolol de liberación prolongada en pacientes sometidos a cirugía no cardiaca.
Puede enmascarar síntomas de hipoglucemia.
La abstinencia abrupta en pacientes con tirotoxicosis podría precipitar una tormenta tiroidea.
Puede agravar los síntomas de la insuficiencia en la enfermedad vascular periférica.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.
Hipertensión y angina: bradicardia sinusal, bloqueo cardíaco de segundo y tercer grado, shock cardiogénico, síndrome del seno enfermo (a menos que se coloque un marcapasos permanente), enfermedad vascular periférica grave, feocromocitoma.
Infarto de miocardio: bradicardia sinusal grave, frecuencia cardíaca <45 latidos/min, presión arterial sistólica <100 mmHg, bloqueo cardíaco significativo de primer grado ((intervalo PR de al menos 0.24 segundos), bloqueo cardíaco de segundo y tercer grado, insuficiencia cardíaca de moderada a grave.

**Interacciones:** Consulte el Formulario Terapéutico.

**Embarazo y lactancia:** Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

**Referencia:** Adaptado de Formulario Terapéutico.