# Parecoxib sódico, polvo liofilizado para solución inyectable, 40 mg/ 2 ml, vial, vía IV/IM, código IGSS: 10365

**Dosis:** Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

**Indicaciones de uso:** Tratamiento a corto plazo del dolor posoperatorio en adultos.

**Reacciones adversas:** Náuseas, faringitis, osteítis alveolar (alveolo seco), anemia postoperativa, hipocalemia, agitación, insomnio, hipoestesia, mareo, hipertensión, hipotensión, insuficiencia respiratoria, dolor abdominal, constipación, dispepsia, flatulencia, prurito, hiperhidrosis, dolor de espalda, oliguria, edema periférico, creatinina en sangre elevada.

**Precauciones de uso:** Estudiado en odontología, ortopedia, ginecología (principalmente histerectomía) y cirugía de injerto de derivación de arteria coronaria, datos limitados en otros tipos de intervenciones.
Exclusivo para uso intravenoso o intramuscular.
Debido al riesgo de aumento de reacciones adversas a dosis altas de parecoxib, otros inhbidores selectivos de la ciclooxigenasa-2 y antiinflamatorios no esteroideos deben revisarse las dosis de mantenimiento en pacientes a los que se les aumentó la dosis, si no se obtiene respuesta clínica debe considerarse el uso de otras opciones terapéuticas.
Los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2 se han asociado con un mayor riesgo de efectos adversos cardiovasculares y eventos trombóticos cuando se toman a largo plazo. Pacientes con factores de riesgo significativos de eventos cardiovasculares (por ejemplo, hipertensión, hiperlipidemia, diabetes mellitus,

tabaquismo) solo deben tratarse con parecoxib después de una cuidadosa consideración.

No descontinuar terapia antiplaquetaria.

El uso concomitante con otros antiinflamatorios no esteroideos que no sean ácido acetil salicílico debe evitarse.

Precaución con el uso concomitante con warfarina y otros anticoagulantes.

Tomar las medidas apropiadas para controlar cualquier reacción cutánea grave, advertir a pacientes que notifiquen cualquier condición emergente de la piel. Descontinuar ante el primer signo de hipersensibilidad.

Parecoxib debe usarse con precaución en pacientes con función cardíaca comprometida, edema preexistente u otras condiciones que predisponga o empeore la retención de líquidos, incluidos los que toman un tratamiento con diuréticos en riesgo o no de hipovolemia.

Posible aparición de insuficiencia renal aguda, precaución en pacientes con antecedentes de insuficiencia renal hipertensión, o en pacientes con compromiso de la función cardíaca o hepática u otras condiciones que predisponen a la retención de líquidos.

No iniciar terapia en pacientes deshidratados, rehidratar y luego iniciar terapia.

Puede provocar la aparición de una nueva hipertensión o el empeoramiento de la preexistente, importante monitorear al paciente durante el inicio y curso de la terapia.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al principio activo o excipientes. Antecedentes de reacciones alérgicas graves previas a medicamentos de cualquier tipo, especialmente reacciones cutáneas como Síndrome de Stevens-Johnson, reacción a fármacos con eosinofilia y síndrome de síntomas sistémicos síndrome de reacción farmacológica con eosinofilia y síntomas sistémicos, necrólisis epidérmica tóxica, eritema multiforme o pacientes con hipersensibilidad a las sulfonamidas.

Úlcera péptica activa o hemorragia gastrointestinal.

Pacientes que han experimentado broncoespasmo, rinitis aguda, pólipos nasales, edema angioneurótico, urticaria u otras reacciones de tipo alérgico después de tomar ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios no esteroideos incluidos los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2.
Tercer trimestre del embarazo y la lactancia.
Insuficiencia hepática grave (albúmina sérica <25 g/l o puntuación de Child-Pugh ≥10). Insuficiencia hepática grave (albúmina sérica <25 g/l o puntuación de Child-Pugh ≥10).
Insuficiencia cardiaca congestiva según la Asociación del Corazón de Nueva York (NYHA) II-IV.
Tratamiento del dolor posoperatorio después de la cirugía de injerto de derivación de arteria coronaria.
Cardiopatía isquémica establecida, enfermedad arterial periférica y/o enfermedad cerebrovascular.

**Interacciones:** Consulte el Formulario Terapéutico.

**Embarazo y lactancia:** Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

**Referencia:** Adaptado de Formulario Terapéutico.