Prednicarbato, crema 0.25%, tubo 10g -30 g, vía tópica, código IGSS: 378

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: tratamiento sintomático de afecciones cutáneas inflamatorias que responden al tratamiento tópico con corticosteriodes, como la dermatitis atópica y la psoriasis (excluyendo la psoriasis en placas extensas).

Reacciones adversas: Exfoliación de la piel, dermatitis irritante, prurito, atrofia cutánea, dolor cutáneo, xeroderma, estrías, lesiones acneiformes, cambios de pigmentación, supresión del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, hipertensión intracraneal, parestesias, dermatitis perioral, urticaria, hipertricosis.

Precauciones de uso: La terapia tópica de largo plazo puede interferir con el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, principalmente en niños y jóvenes.
Puede llegar a intervenir en el crecimiento y desarrollo de niños.
El uso prologado de corticoesteroides puede aumentar la incidencia de infecciones secundarias, enmascararlas, prolongarlas o exacerbarlas.
Se ha reportado miopatía aguda con dosis altas de corticoesteroides.
Los corticoesteroides pueden causar problemas psiquiátricos como depresión, euforia, insomnio, cambios de humor y personalidad.
La dermatitis de contacto puede ocurrir y es diagnostica con la falla del tratamiento y el exacerbamiento de la enfermedad.
Se debe usar con precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades del tracto digestivo, insuficiencia hepática, miastenia grave, infarto del miocardio, cataratas o glaucoma, osteoporosis, insuficiencia renal, patología tiroidea y colitis ulcerativa.

El tratamiento prolongado puede aumentar el riesgo de padecer Sarcoma de Kaposi.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o cualquier componente de la formulación. No debe utilizarse alrededor de los ojos.

No debe utilizarse sobre manifestaciones cutáneas de tuberculosis, sífilis o infecciones víricas, en acné rosácea, dermatitis perioral, acné vulgar, enfermedades atróficas de la piel o sobre heridas abiertas.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.