Quinagolida, tableta, 75 mcg, Vía oral, código IGSS: 307

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la hiperprolactinemia idiopática u originada por un micro o macroadenomas hipofisario secretor de prolactina.

Reacciones adversas: Nausea, vómitos, mareo, fatiga, cefalea, edema, hipotensión, dolor abdominal, anorexia, constipación, dispepsia, insomnio, malestar general, sedación, astenia, congestión nasal, patologías visuales, eritema, palpitaciones, sincope, ganancia de peso, diarrea, mastalgia, psicosis aguda, somnolencia, cambios de humor, perdida de concentración, dolor de miembros, aumento del potasio sérico, aumento de triglicéridos, disminución del hematocrito, disminución de la hemoglobina, neutropenia, aumento de la bilirrubina sérica, aumento de las transaminasas.

Precauciones de uso: Puede causar depresión del sistema nervioso especialmente en pacientes con Parkinson.
Puede causar casos de hipotensión ortostática y un aumento de la frecuencia cardiaca en especial en pacientes con enfermedades graves del corazón.
En algunos pacientes con antecedentes psiquiátricos pueden tener riesgo aumentado de psicosis aguda, esta suele desaparecer al terminar el tratamiento.
Se ha asociado el uso del fármaco con somnolencia, especialmente en pacientes con Parkinson.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquier componente.
Trastornos graves de la función renal y hepática.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.