# Alprazolam, tableta, 0.5 mg, Vía oral, código IGSS: 898

**Dosis:** Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

**Indicaciones de uso:**

Tratamiento de ansiedad generalizada, ansiedad relacionada con síntomas de depresión y tratamiento de trastornos por angustia con o sin agorafobia.

**Reacciones adversas:**

Mayor del 10%, en dosis hasta 4 mg:

Mareo, depresión, cefalea, constipación, diarrea, boca seca.

Mayor del 10%, en dosis hasta 10mg:

Mareo, alteraciones de la coordinación, aumento de apetito, fatiga, alteración de la memoria, irritabilidad, disminución de la salvación, alteraciones cognitivas, insomnio, disminución del apetito, cefalea, disartria, diarrea, constipación, nausea, vómito, cambios de peso, congestión nasal, disminución o aumento de la libido, alteraciones menstruales, dificultad para orinar.

Del 1 al 10% en dosis de hasta 4mg:

Taquicardia, confusión, insomnio, nausea, vómito, visión borrosa, congestión nasal, hipotensión, sincope, acatisia, mareo, aumento de la salivación, nerviosismo, tremor, cambios de peso.

Del 1 al 10%, en dosis de 10mg:

Aumento de la salivación, incontinencia, disminución del habla.

Reportados post comercialización:

Elevación de las enzimas hepáticas, hepatitis, falla hepática, hipomanía, manía, síndrome de Stevens-Johnson, angioedema, edema periférico, hiperprolactinemia, ginecomastia, galactorrea.

**Precauciones de uso:** El uso concomitante de benzodiazepinas y opioides puede resultar en sedación profunda, depresión respiratoria, coma y muerte.

Se debe buscar utilizar la dosis mínima de tratamiento y por periodos de tiempo limitados.

Se debe monitorear a los pacientes por síntomas de depresión respiratoria o sedación.

Existe un riesgo de abuso y adicción de las benzodiazepinas lo cual puede llevar a sobredosis y muerte. La dependencia puede ocurrir cuando se ha consumido el tratamiento de manera continua por varios días o semanas incluso a dosis terapéuticas o en pacientes sin factores de riesgo.

Descontinuar el tratamiento de manera abrupta o redecir la dosis de manera rápida puede causar síntomas de retirada incluyendo convulsiones.

El abuso de las benzodiazepinas usualmente se relaciona con el consumo de otras substancias como alcohol o drogas ilícitas.

Se han reportado casos de amnesia anterógrada, frecuentemente varias horas posteriores a la administración.

Se debe utilizar precaución en pacientes de la tercera edad o con enfermedades debilitantes.

Puede tener efectos prolongados en pacientes obesos.

Se debe utilizar con precaución en pacientes con enfermedad pulmonar, alteraciones renales o hepáticas, glaucoma de ángulo abierto, depresión, ideación suicida, abuso de drogas.

Se han reportado casos de insomnio y ansiedad de rebote posterior a la retirada del tratamiento. Se pueden presentar síntomas como cambios de humor, ansiedad, trastornos del suelo e intranquilidad.

El uso de benzodiacepinas puede producir intranquilidad, agitación, irritabilidad, agresividad, delirio, ataques de ira, pesadillas, alucinaciones, psicosis, comportamiento inadecuado. En caso de ocurrir se debe suspender el tratamiento.

No se recomienda el uso en menores de 18 años.

Se debe utilizar con extrema precaución en pacientes con antecedentes de abuso de alcohol o drogas.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al compuesto. Insuficiencia respiratoria grave. Síndrome de apnea del sueño. Insuficiencia hepática grave. Glaucoma de ángulo abierto. Uso concomitante con inhibidores de la CYP3A4.

**Interacciones:** Consulte el Formulario Terapéutico.

**Embarazo y lactancia:** Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

**Referencia:** Adaptado de Formulario Terapéutico.