Ambroxol, Solución oral 15 mg/ 5ml, Frasco, 120 ml, Vía oral, código IGSS: 1363

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento mucolítico en afecciones broncopulmonares asociadas a una secreción anormal de moco y alteraciones de su transporte.

Reacciones adversas: Trastornos del sistema inmune**,** reacciones de hipersensibilidad, reacciones anafilácticas tales como choque anafiláctico, angioedema y prurito, trastornos del sistema nervioso**,** disgeusia (alteración del sentido del gusto), trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos**,** hipoestesia faríngea, disnea (como síntoma de una reacción de hipersensibilidad), trastornos gastrointestinales, náuseas, hipoestesia oral, vómitos, diarrea, dispepsia, dolor abdominal, sequedad de boca, sequedad de garganta, sialorrea**,** trastornos de la piel y del tejido cutáneo**,** exantema, urticaria**,** reacciones adversas cutáneas graves (tales como eritema multiforme, síndrome de Stevens - Johnson/ necrólisis epidérmica tóxica y pustulosis exantemosa generalizada aguda), trastornos generales y afecciones del lugar de administración**,** fiebre, reacciones mucocutáneas.

Precauciones de uso: En caso de insuficiencia renal o hepatopatía grave, el ambroxol hidrocloruro solo se puede usar después de una consulta médica.
Como en otros medicamentos con metabolismo hepático seguido de eliminación renal, se espera la acumulación de metabolitos de ambroxol producidos en el hígado en el caso de insuficiencia renal grave. En las afecciones respiratorias agudas, se debe buscar consejo médico si los síntomas no mejoran o empeoran durante el curso de la terapia.

Debido a una posible acumulación de secreción, el ambroxol hidrocloruro debe usarse con precaución cuando la función broncomotora se encuentre alterada y se generen grandes cantidades de secreción (por ejemplo, en la discinesia ciliar primaria rara).
Se han recibido notificaciones de reacciones cutáneas graves, tales como eritema multiforme, síndrome de Stevens - Johnson (SSJ)/necrolisis epidérmica tóxica (NET) y pustulosis exantematosa generalizada aguda (PEGA), asociadas a la administración de ambroxol hidrocloruro. Si el paciente presenta síntomas o signos de exantema progresivo (en ocasiones asociado a ampollas o lesiones de las mucosas), se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con ambroxol hidrocloruro y se debe consultar a un médico.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.