Amoxicilina + Ácido clavulánico, polvo para suspensión 250 mg + 62.5 mg/ 5 ml, frasco 60 ml, vía oral, código IGSS: 142

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de infecciones en pacientes pediátricos, debidas a bacterias aisladas susceptibles de las designadas en las condiciones enumeradas a continuación: Infecciones del tracto respiratorio inferior: causadas por aislamientos productores de betalactamasa de Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis.
Otitis media bacteriana aguda: causada por aislamientos productores de betalactamasa de H. influenzae y M. catarrhalis.
Sinusitis: causada por aislamientos productores de betalactamasa de H. influenzae y M. catarrhalis.
Infecciones de la piel y de la estructura de la piel: causadas por aislamientos productores de betalactamasa de Staphylococcus aureus, Escherichia coli y especies de Klebsiella.
Infecciones del tracto urinario: causadas por cepas de E. coli productoras de betalactamasa, especies de Klebsiella y especies de Enterobacter.

Reacciones adversas: Diarrea, erupción del pañal, micosis, náuseas, erupción, vómitos, heces blandas, candidiasis, vaginitis, reacciones hipersensibles, anafilaxia, anemia, trombocitopenia, leucopenia, agranulocitosis, hepatotoxicidad, elevación aspartato aminotransferasa/Alanina aminotransferasa, colitis pseudomembranosa enfermedad del suero, malestar abdominal, ictericia colestásica, flatulencia.

Precauciones de uso: Reacciones de hipersensibilidad graves (incluso mortales), es importante suspender si ocurre una reacción alérgica.
Reacciones adversas cutáneas severas como síndrome de Steven Johnson o necrosis epidérmica tóxica, entre otras. Vigile de cerca si aparecen erupciones y discontinuar si la erupción progresa.
Disfunción hepática e ictericia colestásica ha sido asociada con el uso de amoxicilina/acido clavulánico, suspender si aparecen signos/síntomas de hepatitis.
Vigilar las pruebas de función hepática en los pacientes con insuficiencia hepática.
Diarrea asociada a Clostridioides difficile puede ocurrir, evalúe a los pacientes en caso de producirse diarrea.
La posibilidad de superinfecciones con hongos o bacterias los patógenos deben ser considerados durante la terapia.

Contraindicaciones: Pacientes con antecedentes de reacciones de hipersensibilidad graves (anafilaxia o síndrome de Stevens-Johnson) a amoxicilina, clavulanato u otros fármacos antibacterianos betalactámicos (penicilinas y cefalosporinas).
Pacientes con antecedentes de ictericia colestásica/hepatitis disfunción asociada con amoxicilina/acido clavulánico.
Para reducir el desarrollo de bacterias resistentes a los medicamentos y mantener la eficacia de amoxicilina/acido clavulánico y otros medicamentos antibacterianos, debe usarse solo para tratar o prevenir infecciones de las que se ha demostrado o se sospecha firmemente que son causadas por bacterias susceptibles.
Cuando se dispone de información sobre cultivo y susceptibilidad, deben tenerse en cuenta al seleccionar o modificar la terapia antibacteriana. En ausencia de tales datos, la epidemiología local y la susceptibilidad pueden contribuir a la selección empírica de la terapia.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.