Candesartán, tableta, 32 mg, vía oral, código IGSS: 10569

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Solo o en combinación para el tratamiento de la hipertensión en adultos y en niños de 1 a <17 años de edad, para reducir la presión.
Tratamiento de la insuficiencia cardíaca (Asociación del Corazón de Nueva York clase II-IV) en adultos con presión sistólica del ventrículo izquierdo (fracción de eyección ≤ 40%) para reducir la muerte cardiovascular y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca.

Reacciones adversas: Edema periférico, mareo, hipertrigliceridemia, hiperuricemia, fatiga, dolor abdominal, diarrea, náuseas, artralgia, dolor de espalda, dolor en el pecho, angina de pecho, taquicardia, palpitación, albuminuria, bronquitis, tos, faringitis, dispepsia, gastroenteritis, rinitis, erupción, angioedema.

Precauciones de uso: Niños menores de un año no deben recibir candesartán para el tratamiento de hipotensión. Observar por signos y síntomas de hipotensión. Monitorear la función renal y los niveles de potasio.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes. Insuficiencia hepática grave. No coadministrar con aliskiren en pacientes con diabetes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.