Ciprofloxacina, Solución oftálmica, 0.3%, frasco gotero, 5 ml, vía tópico ocular, código IGSS: 2030

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de infecciones causadas por cepas susceptibles de los microorganismos designados en las condiciones que se enumeran a continuación:
Úlceras corneales: Pseudomonas aeruginosa, Estafilococo aureus, Estafilococo epidermidis steotococos neumonía.
Conjuntivitis: Haemophilus influenzae, Estafilococo aureus, Estafilococo epidermidis, steotococos neumonía.

Reacciones adversas: Quemazón, precipitado de ciprofloxacina en porción superficial de defecto corneal, escozor.
Hiperemia conjuntival, cristales o escamas en las pestañas, sensación de cuerpo extraño, picor, queratopatía o queratitis, costras en el margen del párpado, sabor desagradable después de la instilación.
Infiltrados corneales, tinción corneal, disminución de la visión, edema del párpado, malestar ocular, fotofobia, reacciones de sensibilidad, lagrimeo.

Precauciones de uso: No debe inyectarse en el ojo. No utilizar lentes de contacto, remover antes de utilizar. El uso prolongado puede provocar sobrecrecimiento de microorganismos no susceptibles. Descontinuar al primer aparecimiento de rash o hipersensibilidad.

Contraindicaciones: Resistencia a la ciprofloxacina o hipersensibilidad a las quinolonas o excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.