Clobetasol propionato, crema o ungüento 0.05%, tubo 25- 30 g, vía tópica, código IGSS: 1387

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Alivio de síntomas inflamatorios y prurito en dermatosis que no responden a corticoesteroides menos potentes. Psoriasis, eczemas recalcitrantes, liquen plano, lupus eritematoso discoide.

Reacciones adversas: Atrofia cutánea, telangiectasias, piel seca.
Frecuentemente no definidas:
Atrofia cutánea, estrías, sensación de quemadura, fisuras, eritema, foliculitis, irritación cutánea, prurito, hipopigmentación, hipertensión intracraneal, lesiones acneiformes, infecciones secundarias, cambios de pigmentación, supresión del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal con usos continuos de más de dos semanas.

Precauciones de uso: La terapia tópica de largo plazo puede interferir con el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, principalmente en niños y jóvenes.
Puede llegar a intervenir en el crecimiento y desarrollo de niños.
El uso prologado de corticoesteroides puede aumentar la incidencia de infecciones secundarias, enmascararlas, prolongarlas o exacerbarlas. Si el medicamento se utiliza en parpados se debe tener especial cuidado con el contacto del medicamento con los ojos ya que puede ocasionar glaucoma.
El uso de esteroides tópicos en pacientes con psoriasis puede causar recaídas por efecto rebote, desarrollo de tolerancia, riesgo de psoriasis pustulosa generalizada y desarrollo de toxicidad local o sistémica. Se ha reportado miopatía aguda con dosis altas de corticoesteroides.

Los corticoesteroides pueden causar problemas psiquiátricos como depresión, euforia, insomnio, cambios de humor y personalidad.

La dermatitis de contacto puede ocurrir y es diagnostica con la falla del tratamiento y el exacerbamiento de la enfermedad.
Se debe usar con precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades del tracto digestivo, insuficiencia hepática, miastenia grave, infarto del miocardio, cataratas o glaucoma, osteoporosis, insuficiencia renal, patología tiroidea y colitis ulcerativa. El tratamiento prolongado puede aumentar el riesgo de padecer Sarcoma de Kaposi.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto, micosis sistémicas, pacientes con rosácea, acné vulgar, infecciones virales cutáneas primarias, prurito perianal y genital, lesiones cutáneas infectadas, dermatosis en niños menores de un año incluyendo dermatitis de pañal.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.