Dimenhidrinato, solución inyectable, 50 mg/ml, ampolla 1 ml, vía intramuscular e intravenosa, código IGSS: 228

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Prevención y tratamiento de las náuseas, vómitos o vértigo del mareo por locomoción.
Náuseas y vómitos del postoperatorio y del embarazo.
Mareo y vértigo subsiguientes a la radioterapia y el electroshock.
Síndrome de Meniére.
Laberintitis.
Disfunción vestibular producida por algunos antibióticos.

Reacciones adversas: Estimulación paradójica del sistema nervioso central (niños y ocasionalmente en adultos); depresión del sistema nervioso central, somnolencia; sedación que va desde somnolencia leve hasta sueño profundo (más frecuente); mareo; lasitud; coordinación perturbada; debilidad muscular; inquietud, insomnio, temblores, euforia, nerviosismo, delirio, palpitaciones, convulsiones es menos frecuente; malestar epigástrico; anorexia; náuseas; vómitos; diarrea; constipación; colestasis, hepatitis, insuficiencia hepática, anormalidad de la función hepática, la ictericia es rara; eccema, prurito, inflamación, erupción papular, eritema en la piel expuesta puede ocurrir con la formulación tópica; taquicardia, palpitaciones Cambios en el electrocardiograma (p. ej., QRS ensanchado); arritmias (p. ej., extrasístole, bloqueo cardíaco); hipotensión; hipertensión: los pacientes geriátricos pueden presentar mareos, sedación e hipotensión; sequedad de boca, nariz y garganta; disuria; retención urinaria; impotencia; vértigo; alteraciones visuales; visión borrosa; diplopía; tinnitus; laberintitis aguda; insomnio; temblores;

nerviosismo; irritabilidad; discinesia facial; opresión en el pecho; espesamiento de las secreciones bronquiales; sibilancias; congestión nasal; transpiración; escalofríos; menstruaciones tempranas; psicosis tóxica; dolor de cabeza; debilidad; parestesia; agranulocitosis; anemia hemolítica; leucopenia; trombocitopenia; pancitopenia.

Precauciones de uso: Puede provocar somnolencia y los pacientes bajo tratamiento no deberán conducir vehículos u operar maquinarias donde una disminución de la atención pueda originar accidentes.
Posibilidad de efectos tóxicos sobre el sistema hematopoyético en tratamiento de larga duración.
No se recomienda su utilización en mujeres lactantes, en recién nacidos ni en niños prematuros debido a una mayor sensibilidad a los efectos secundarios antimuscarínicos.
Acción antiemética puede dificultar el diagnóstico de enfermedades como apendicitis y enmascarar los signos de toxicidad producidos por sobredosificación de otros fármacos.
Obstrucción del cuello vesical, retención urinaria y glaucoma de ángulo estrecho.
Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad documentada al dimenhidrinato o difenhidramina.

Enfermedad de las vías respiratorias inferiores, por ejemplo, asma (controvertido).
Glaucoma.
Síntomas de hipertrofia prostática.
Prematuros y neonatos.
Mujeres en lactancia.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.