Etoricoxib, tableta, 60 mg, vía oral, código IGSS: 10586

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Adultos y adolescentes de 16 años de edad y mayores para alivio sintomático de la artrosis, la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante y el dolor y signos de inflamación asociados a la artritis gotosa aguda. Tratamiento a corto plazo del dolor moderado asociado a cirugía dental.

Reacciones adversas: Dolor abdominal, osteítis alveolar, edema/retención de líquidos, mareo, cefalea, palpitaciones, arritmia, hipertensión, broncoespasmo, estreñimiento, flatulencia, gastritis, ardor de estómago/reflujo ácido, diarrea, dispepsia/malestar epigástrico, náuseas, vómitos, esofagitis, úlcera bucal, alanina aminotransferasa elevada, aspartato aminotransferasa elevada, equimosis, astenia/ fatiga, enfermedad tipo gripal.

Precauciones de uso: Complicaciones del tracto gastrointestinal superior (perforaciones, úlceras o hemorragias); algunas de ellas con resultados mortales. Precaución en pacientes con elevado riesgo de desarrollar una complicación gastrointestinal con antiinflamatorios no esteroideos o uso concomitante con otros antiinflamatorios no esteroideos, antecedentes de enfermedad gastrointestinal, ulcera o hemorragia.
El uso concomitante con ácido acetilsalicílico aumente el riesgo de reacciones adversas como úlcera gastroduodenal u otras complicaciones. Medicamentos inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2 puede asociarse con un riesgo de acontecimientos trombóticos (principalmente infarto de miocardio y accidente cerebrovascular), en relación a placebo y a algunos antiinflamatorios no esteroideos.

Pacientes con factores de riesgo significativos para acontecimientos cardiovasculares (p. ej.: hipertensión, hiperlipidemia, diabetes mellitus, tabaquismo), sólo deben ser tratados con etoricoxib después de una cuidadosa valoración. No deben interrumpirse los tratamientos antiagregantes plaquetarios en la profilaxis de enfermedades cardiovasculares tromboembólicas.

Pacientes con perfusión renal comprometida, la administración de etoricoxib puede producir una reducción de la formación de prostaglandinas y, secundariamente, una reducción del flujo sanguíneo renal, y en consecuencia una alteración de la función renal.

Todos los antiinflamatorios no esteroideos pueden asociarse con insuficiencia cardiaca congestiva de nueva aparición o recurrente, cuidado en pacientes con historia de insuficiencia cardiaca, disfunción ventricular izquierda o hipertensión, y en los pacientes que presentan edema preexistente por cualquier otra causa.

Control y monitoreo de la presión arterial antes y después del inicio del tratamiento con etoricoxib. Posibles elevaciones de alanina aminotransferasa y/o aspartato aminotransferasa. Precaución cuando se administra concomitantemente etoricoxib con warfarina u otros anticoagulantes orales. No utilizar en mujeres que intenten concebir.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

Úlcera péptica activa o hemorragia gastrointestinal activa.

Pacientes que, después de tomar ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios no esteroideos, incluyendo inhibidores de la ciclooxigenasa-2, experimenten broncoespasmo, rinitis aguda, pólipos nasales, edema angioneurótico, urticaria o reacciones de tipo alérgico.

Embarazo y lactancia: disfunción hepática grave (albúmina sérica <25 g/l o puntuación de Child-Pugh ≥10).

Aclaramiento de creatinina renal estimado < 30 ml/min.

Niños y adolescentes menores de 16 años de edad.

Enfermedad inflamatoria intestinal. Insuficiencia cardiaca congestiva según la Asociación del Corazón de Nueva York (NYHA) II-IV. Pacientes con hipertensión cuya presión arterial esté constantemente elevada por encima de 140/90 mm de Hg y no haya sido controlada adecuadamente.
Cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica y/o enfermedad cerebrovascular establecidas.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.