Lamotrigina, tableta, tableta masticable o dispersable, 25 mg, vía oral, código IGSS: 837

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso:

Epilepsia: Terapia adyuvante en pacientes de 2 años de edad y mayores que presenten:

Convulsiones de inicio parcial.

Convulsiones tónico-clónicas generalizadas primarias.

Convulsiones generalizadas del síndrome de Lennox-Gastaut.

Monoterapia:

Conversión a monoterapia en adultos (mayores de 16 años) con convulsiones de inicio parcial que están recibiendo tratamiento con carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona o valproato como único fármaco antiepiléptico.

Trastorno bipolar:

Tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar I para retrasar el tiempo de aparición de episodios del estado de ánimo (depresión, manía, hipomanía, episodios mixtos) en pacientes tratados para episodios agudos del estado de ánimo con terapia estándar.

Reacciones adversas: Mareos, diplopía, dolor de cabeza, ataxia, visión borrosa, rinitis, somnolencia, insomnio, fatiga, dolor de pecho, edema periférico, ideación suicida, dermatitis, piel seca, aumento de la libido, hemorragia rectal, debilidad, agitación, disartria, edema, fiebre, migraña, pensamientos anormales, frecuencia urinaria, temblor.

Precauciones de uso: Erupción cutánea grave potencialmente mortal y/o muerte relacionada. Suspender en el primer signo de erupción, a menos que la erupción claramente no esté relacionada con el medicamento.

Posible linfohistiocitosis hemofagocítica evalúe pacientes inmediatamente si desarrollan signos o síntomas de inflamación e interrumpa si no se encuentra una etiología alternativa.

Reacción de hipersensibilidad mortal o potencialmente mortal: multiorgánica también conocidas como reacciones al fármaco con eosinofilia y síntomas sistémicos, puede ser mortal o potencialmente mortal. Los primeros signos pueden incluyen erupción cutánea, fiebre y linfadenopatía. Estas reacciones pueden ser asociado con afectación de otros órganos, como hepatitis, insuficiencia hepática, discrasias sanguíneas o insuficiencia multiorgánica aguda.

Discontinuar si no se encuentra una etiología alternativa para esta reacción.

Podría causar arritmias graves y/o la muerte en pacientes con ciertos trastornos cardíacos subyacentes o arritmias.

Pueden ocurrir discrasias sanguíneas como neutropenia, trombocitopenia, pancitopenia, leucopenia, anemia, entre otras; ya sea con o sin un síndrome de hipersensibilidad multiorgánica asociada. Controlar si hay signos de anemia, infección inesperada o sangrado.

Comportamiento e ideación suicidas, controlar.

Incrementa el riesgo de desarrollar meningitis aséptica; controlar.

Errores de medicación debido a la confusión del nombre del producto, plan educacional al paciente.

En uso prolongado puede causar toxicidad en los tejidos ricos en melanina debido a la acumulación de lamotrigina por su facilidad de unirse a la melanina.

Valproato reduce la depuración de lamotrigina, la dosis de lamotrigina en la presencia de valproato es menos de la mitad de la requerida en su ausencia.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.