Lenalidomida, cápsula, 10 mg, vía oral, código IGSS: 2103

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: En combinación con dexametasona está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple.
Terapia de mantenimiento en pacientes adultos con mieloma múltiple después de un trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas.
Tratamiento de pacientes adultos con anemia dependiente de transfusión debido a síndromes mielodisplásicos de riesgo bajo o intermedio 1; asociado con una anomalía citogenética de deleción 5q con o sin anomalías citogenéticas adicionales.
Tratamiento de pacientes adultos con linfoma de células del manto cuya enfermedad ha recaído o progresado después de dos terapias previas, una que incluía bortezomib.
En combinación con un producto de rituximab, está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma folicular previamente tratado.

Reacciones adversas: Trombocitopenia, neutropenia, diarrea, prurito, náuseas, erupción, fatiga, estreñimiento, artralgia, dolor de espalda, edema periférico, pirexia, mareos, dolor de cabeza, tos, calambre muscular, disnea, infección del tracto respiratorio superior, anemia, neumonía, infección del tracto urinario, reacción de brote tumoral – mcl 10%), dolor abdominal, leucopenia, mialgia, dolor, bronquitis, rinitis, neutropenia febril, neuropatía periférica

Precauciones de uso: No usar durante el embarazo, ya que al ser un análogo de la talidomida puede ocasionar defectos de nacimiento o muerte embriofetal.
Deben realizarse al menos dos pruebas negativas de embarazo antes de iniciar el tratamiento con lenalidomida.

Utilizar dos métodos de anticoncepción (mujeres) o abstenerse de tener relaciones heterosexuales durante y al menos 4 semanas después de concluido el tratamiento (hombres y mujeres).
Los hombres siempre deben usar un condón de látex o sintético durante cualquier contacto sexual con mujeres.
Puede causar neutropenia y trombocitopenia significativas.
Los hemogramas completos de los síndromes deben controlarse semanalmente durante las primeras 8 semanas de tratamiento y al menos una vez al mes a partir de entonces.
Los pacientes pueden requerir la interrupción y/o reducción de la dosis. Los pacientes pueden requerir el uso de productos sanguíneos de apoyo y/o factores de crecimiento.
Riesgo significativamente mayor de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, así como riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular en pacientes con mieloma múltiple que fueron tratados con lenalidomida y dexametasona.
Vigilar y asesorar a los pacientes sobre los signos y síntomas de tromboembolismo.
Anticoncepción:
Mujeres: Las mujeres en edad reproductiva deben comprometerse a abstenerse continuamente de tener relaciones sexuales heterosexuales o a usar 2 métodos anticonceptivos confiables simultáneamente: una forma altamente efectiva de anticoncepción (p. ej., ligadura de trompas, DIU, anticonceptivos hormonales), o vasectomía de la pareja, y 1 método anticonceptivo efectivo adicional (p. ej., condón masculino de látex o sintético, diafragma o capuchón cervical).

La anticoncepción debe comenzar 4 semanas antes de iniciar el tratamiento, durante la terapia, durante las interrupciones de la dosis y continuar durante las 4 semanas posteriores a la interrupción de la terapia.
La anticoncepción confiable está indicada incluso cuando ha habido antecedentes de infertilidad, a menos que se deba a una histerectomía.

Las mujeres con potencial reproductivo deben derivarse a un proveedor calificado de métodos anticonceptivos, si es necesario.
Hombres: Presente en el semen, por lo tanto, los hombres siempre deben usar un condón de látex o sintético durante cualquier contacto sexual con mujeres con potencial reproductivo mientras toman lenalidomida y hasta 4 semanas después de suspenderlo, incluso si se han sometido a una vasectomía exitosa.
Los pacientes varones que toman lenalidomida no deben donar esperma.

Contraindicaciones: El embarazo; mujeres sexualmente activas en edad fértil que no utilizan 2 métodos anticonceptivos.
Hipersensibilidad demostrada (p. ej., angioedema, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica).

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.